

黃秋葵栽培管理

作物改良課 李阿嬌 分機 232

黃秋葵俗稱羊角豆、羊角菜。錦葵科一年生草本植物，原產非洲東北部，喜好高溫陽光，耐溼、耐旱。果實生長迅速，在高溫時期，果實發育容易纖維化，品質不易控制，且果實上有剛毛，部份品種全株亦見剛毛，田間操作不便，收穫後果實易因受傷而褐化，因此在台灣之栽培面積不大；但由於具有病蟲害少，耐高溫、高濕，且生育快速、採收期長的特性，非常適合夏季栽植，故將黃秋葵栽培管理技術簡述如下，以作為農友於夏季採行少量多樣化作物栽培的參考。

黃秋葵品種可以植株高低、稜角數、莢果顏色、剛毛有無等分類；一般以綠莢、無剛毛者較受市場歡迎。

黃秋葵喜暖熱氣候，不耐寒冷，植株生育、結果之適溫均在 25℃ 以上；在北部播種適期為 3-7 月，播種後約 10-14 天即可定植。黃秋葵對土壤適應性強，為深根性作物，故宜選擇排水良好，土壤深厚，有機質豐富的土壤栽培為宜。定植前應整地作畦，每分地施有機肥料 800-1000 公斤。採不整枝栽培之行株距可為 70x75-90 公分。黃秋葵果實著生於葉腋間，結果節位一般在第 4-7 節起。嫩果約於開花後 3-5 天，果長約 5-8 公分為最佳採收期。高溫盛產期宜每日採收，採收時須注意勿碰傷，以免褐化影響賣相。黃秋葵需肥性強，採收期可酌施 43 號複合肥料當追肥。在田間管理良好下，採收期可達 3-6 個月。在北部主要病蟲害為粉蝨及疫病，但粉蝨並不直接危害果實。



黃秋葵花及果實