

菜豆(敏豆、四季豆)病蟲害防治藥劑

病蟲害名稱	藥劑名稱	劑型與倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
苗立枯病	綠木黴菌 R42	2x10 ⁸ cfu/g 微粒劑 1/200 介質混拌或 2000 倍稀釋液澆灌	0	
幼苗疫病	依得利*	35%可濕性粉劑 3000 倍	苗期使用	F3
	依得利*	25%乳劑 1500 倍	苗期使用	F3
疫病	亞托敏*	23%水懸劑 1000 倍	14	C3
露菌病	松香酯銅*	48%乳劑 1000 倍	0	mc1
	亞托敏*	23%水懸劑 2000 倍	14	C3
白絹病	撲滅寧*	50%可濕性粉劑 2000 倍	14	E3
白粉病	碳酸氫鉀*	80%水溶性粉劑 1000 倍	0	
	礦物油*	99%乳劑 500 倍	0	NC
	枯草桿菌*	50%可濕性粉劑 800 倍	0	F6
	平克座*	10.5%乳劑 4000 倍	6	G1
	白克列*	50%水分散性粒劑 2500 倍	9	C2
	撲滅寧*	50%可濕性粉劑 1200 倍	14	E3
	待克利*	24.9%乳劑 3000 倍	3	G1
	待克利*	24.9%水懸劑 3000 倍	3	G1
	待克利*	250g/L 乳劑 3000 倍	3	G1
	待克利*	10%水分散性粒劑 1200 倍	3	G1
	三得芬*	84.2%乳劑 3500 倍	9	G2
炭疽病	百克敏*	23.6%乳劑 3000 倍	7	C3
	亞托待克利*	325g/L 水懸劑 2000 倍	7	C3+G1
	待克利*	24.9%乳劑 3000 倍	3	G1
	待克利*	24.9%水懸劑 3000 倍	3	G1
	待克利*	250g/L 乳劑 3000 倍	3	G1
	待克利*	10%水分散性粒劑 800 倍	3	G1
	四氯異苯腈*	75%可濕性粉劑 600 倍	6	mc5
	四氯異苯腈*	75%水分散性粒劑 600 倍	6	mc5
	四氯異苯腈*	40%水懸劑 300 倍	6	mc5
銹病	嘉保信*	75%可濕性粉劑 600 倍	6	C2
	白列克敏	38%水分散性粒劑 1500 倍	9	C2+C3
	鋅錳乃浦	33%水懸劑 400 倍	12	mc3
	三得寧	30%乳劑 1000 倍	4	G2+G1

角斑病	待克利	24.9%乳劑 3000 倍	3	G1
	待克利	24.9%水懸劑 3000 倍	3	G1
灰黴病	賽普護汰寧*	62.5%水分散性粒劑 2000 倍	14	D1+E2
	派美尼*	37.4%水懸劑 1500 倍	14	D1
花部薊馬類	畢芬寧	2.8%乳劑 1000 倍	3	3A
	畢芬寧	2.5%水懸劑 1000 倍	3	3A
葉部薊馬類	亞滅培*	20%水溶性粉劑 4000 倍	6	4A
	佈飛松*	43%乳劑 800 倍	10	1B
	益達胺*	9.6%溶液 2000 倍	9	4A
	益達胺*	9.6%水懸劑 2000 倍	9	4A
	賽洛寧*	2.5%微乳劑 2000 倍	9	3A
	賽洛寧*	2.46%膠囊懸著劑 2000 倍	9	3A
	賽洛寧*	2.8%乳劑 2000 倍	9	3A
	賜諾殺*	2.5%水懸劑 1000 倍	3	5
	貝他-賽扶寧*	2.9%乳劑 1500 倍	9	3A
	福化利*	25%乳劑 3000 倍	7	3A
根、莖潛蠅類	賽滅淨*	8.9%溶液 1000 倍	7	17
(斑潛蠅類)	賽滅淨	75%可濕性粉劑 6000 倍	7	17
	賽滅淨	75%可濕性粉劑 5000 倍	6	17
	賽洛寧*	2.5%微乳劑 1000 倍	10	3A
	賽洛寧*	2.46%膠囊懸著液 1000 倍	10	3A
	賽洛寧*	2.8%乳劑 1000 倍	10	3A
	福瑞松	10% 粒劑 1 克/4 穴 10kg/ha	?	1B
赤葉蟊	大克蟊	18.5%可濕性粉劑 500 倍	?	un
(豆類紅蜘蛛)	芬佈克蟊	35%可濕性粉劑 500 倍	7	12B+un
	大克蟊	35%可濕性粉劑 950 倍	?	un
	福瑞松	10% 粒劑 1 克/4 穴 10kg/ha	?	1B
(葉蟊類)	畢達本	20%可濕性粉劑 3000 倍	14	21A
蚜蟲類	畢芬寧*	2.5%水懸劑 1000 倍	3	3A
	畢芬寧*	2.8%乳劑 1000 倍	3	3A
	福瑞松	10% 粒劑 1 克/4 穴 10kg/ha	?	1B
粉蝨類	達特南*	20%水溶性粒劑 3000 倍	9	4A
	益達胺*	28.8%溶液 4500 倍	9	4A
	益達胺*	9.6%溶液 1500 倍	9	4A
	益達胺*	9.6%水懸劑 1500 倍	9	4A

	派滅淨*	25%可濕性粉劑 2000 倍	21	9B
夜蛾類、毒蛾類、螟蛾類	賽速安勃*	40%水分散性粒劑 5000 倍	6	C2+28
	賽速安勃*	300g/L 乳劑 4000 倍	6	C2+28
	陶斯松*	44.9%乳劑 1000 倍	16	1B
	克凡派*	10%水懸劑 1000 倍	18	13
	賽洛寧*	2.46%膠囊懸著劑 2000 倍	3	3A
	賽洛寧*	2.5%微乳劑 2000 倍	3	3A
	賽洛寧*	2.8%乳劑 2000 倍	3	3A
	馬拉松*	50%乳劑 500 倍	4	1B
豆莢螟	加保利	50%可濕性粉劑 1000 倍	7	1A
	加保利	85%可濕性粉劑 1700 倍	7	1A
1.本表適用於菜豆(敏豆、四季豆)，內容如有錯誤，均以農藥主管機關公告(「農藥資訊服務網」網站網址為 http://pesticide.baphiq.gov.tw)為準				
2.表列防治藥劑依植物保護手冊 103 年 01 月 03 日網路版整理(http://www.tactri.gov.tw)				
3.如有安全用藥或病蟲害問題，請洽詢台中區農業改良場植物保護研究室 04-8521493				
4.表列防治藥劑已加入防檢局 103 年 02 月 20 日公告作物之農藥延伸使用範圍				
5.表列防治藥劑已加入防檢局 103 年 04 月 11 日及 103 年 3 月 11 日公告作物之農藥使用方法與範圍				
*延伸使用藥劑				