

肥培管理

營養補充多以基肥、追肥及葉施等三種方式。基肥一般於冬季休眠期或前作採收後整枝前使用。追肥分別於開花著果後、硬核前期、著色前期及採收後施肥，生產第二收葡萄者應儘速重新施基肥，且注意不可與催花期太接近。

一年二收之夏果施肥量為每公頃施用 $N-P_2O_5-K_2O=140-125-140$ 公斤；基肥施腐熟堆肥化之有機質肥料用量為每公頃6,000~8,000公斤，並應開溝埋入畦中與園土充分混合。冬果施肥量為每公頃施用 $N-P_2O_5-K_2O=100-140-100-70-100$ 公斤；基肥施有機質肥料量每公頃為6,000~8,000公斤，施於畦面並淺耕與土壤混合即可，不宜深耕傷及葡萄根系；此時期若使用高肥效的有機複合肥料（粒劑）為基肥，則應依其所含三要素量，酌量減施各生育時期之化肥用量。各施肥時期及分配率如下：

- （一）基肥（修剪時期）：氮肥40%、磷肥100%、鉀肥30%及有機質肥料100%。
- （二）著果後（幼果期）：氮肥20%、鉀肥20%。
- （三）硬核前期：氮肥20%、鉀肥25%。
- （四）轉色前期：氮肥10%、鉀肥25%。
- （五）採收後：氮肥10%（採收後如不做第二收葡萄，可施下10%氮肥以培養枝梢；若已嚴重落葉者，勿再施用氮肥）。

▲葡萄肥

策，
肥大

表一
園。

葡萄
量，

斤/公
算為

K_2O
磷

242

顯示

(5: