



柑橘類病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
寄生性線蟲	10%托福松粒劑	50 公克/株		1B
	10%芬滅松粒劑	75 公克/株		1B
	30%滅線蟲粒劑	70 公克/株		4
	10%普伏松粒劑	75 公克/株		1B
	25%幾丁質粒劑	7.5 公斤/株		
	40%芬滅松乳劑	2000		1B
	5%丁基加保扶粒劑	200 公克/株		1A
炭疽病	23.6%百克敏乳劑	3000	7	C3
	80%免得爛水分散性粒劑	500	25	M3
瘡痂病	70%腈硫醃水分散性粒劑	1000		M9
	70%腈硫醃可溼性粉劑	1000		M9
	40%快得寧可溼性粉劑	500		M1
	70%甲基多保淨可溼性粉劑	1000		B1
	15%易胺座可溼性粉劑	3000	6	G1
	23%亞托敏水懸劑	3000	6	C3
	39.5%扶吉胺水懸劑	2000	10	C5
	50%免賴得可溼性粉劑	3000		B1
疫病	27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	6	M1
	80%福賽得可溼性粉劑	200	6	33 ,un
	76.5%銅滅達樂混合可溼性粉劑	1000	9	M1, A1
	53%鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	500	21	M3,A1
	58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑	500	21	M3,A1
儲藏性病害	40%腐絕可溼性粉劑	500	4	B1
	25%克熱淨溶液	2000	4	M7
潰瘍病	56%氧化亞銅可溼性粉劑	600	-	M1



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	81.3%嘉賜銅可溼性粉劑	1000		D3, M1
	72%波爾多可溼性粉劑	500	6	M1
	61.4%氫氧化銅水分散性粒劑	500	-	M1
	10%維利黴素溶液	800	-	H3
黑星病	50%免賴得可溼性粉劑	3000		B1
	75%四氯異苯腈可溼性粉劑	500		M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	500		M5
	70%甲基鋅乃浦可溼性粉劑	500	40	M3
	50%免賴得可溼性粉劑 + 97%礦物油	4000 + 200		B1
	80%鋅錳乃浦可溼性粉劑 + 97%礦物油	650 + 200		M3
	80%免得爛水分散性粒劑	500	25	M3
	80%鋅錳乃浦可溼性粉劑	500	40	M3
	16%腈硫克敏水分散性粒劑	1000	21	M9,C3
	70%腈硫醃水分散性粒劑	1000		M9
	70%腈硫醃可溼性粉劑	1000		M9
黑點病(褐色蒂腐病)	22.7%腈硫醃水懸劑	1000	30	M9
	80%鋅錳乃浦可溼性粉劑	500	40	M3
	33%鋅錳乃浦水懸劑	500	40	M3
	50%三氟敏水分散性粒劑	10000	金桔、金柑採收前27天停止	C3



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
			施藥。其他柑桔類採收前21天停止施藥	
	56%貝芬硫醃可溼性粉劑	800	30	B1,M9
	40%腐絕可濕性粉劑	500	果實包裝前用	B1
白紋羽病	39.5%扶吉胺水懸劑	500	10	C5
有殼介殼蟲	33%納得護賽寧可溼性粉劑	1200	9	1A, 3A
	50%馬拉松乳劑	800		1B
	50%馬拉松乳劑 + 95%礦物油乳劑	800 + 95		1B
	20%大滅松乳劑	450	21	1B
	44%大滅松乳劑	1000		1B
	20%布芬三亞蟎乳劑	1000	18	16, 19
	31.6%丁基加保扶乳劑	400	21	1A
	40%布芬淨水懸劑	1500	18	16
	95%礦物油乳劑	95	-	
盾介殼蟲	150g/L 賜派滅水分散性油懸劑	3000	7	23
無殼介殼蟲	50%馬拉松乳劑	800		1B
	50%馬拉松乳劑 + 95%礦物油乳劑	800 + 95	14	1B
	20%大滅松乳劑	450		1B
	44%大滅松乳劑	1000		1B
	95%礦物油乳劑	95	-	
粉介殼蟲	50%速殺氟水分散性粒劑	7500	14	4C



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%馬拉松乳劑	800		1B
	50%馬拉松乳劑 + 95%礦物油乳劑	800 + 95	14	1B
	44%大滅松乳劑	1000		1B
	50%加福松乳劑	1200	15	1B
介殼蟲類	11%百利普芬乳劑	1500	12	7C
	11%百利普芬水基乳劑	1000	12	7C
蚜蟲類	50%馬拉松乳劑	800		1B
	50%馬拉松乳劑 + 95%礦物油乳劑	800 + 95	14	1B
	20%大滅松乳劑	450		1B
	44%大滅松乳劑	1000		1B
	25%硫滅松乳劑	1000		1B
	20%免扶克乳劑	800	20	1A
	31.6%丁基加保扶乳劑	1200	20	1A
	40%丁基加保扶可溼性粉劑	1200	20	1A
	20%亞滅培可溶性粉劑	4000	7	4A
木蝨、刺粉蝨	50%馬拉松乳劑	800		1B
	50%馬拉松乳劑 + 95%礦物油乳劑	800 + 95	14	1B
	20%大滅松乳劑	450		1B
	44%大滅松乳劑	1000		1B
	50%陶滅蝨可溼性粉劑	1000	21	1B, 1A
潛葉蛾	50%馬拉松乳劑	800		1B
	50%馬拉松乳劑 + 95%礦物油乳劑	800 + 95	14	1B
	20%大滅松乳劑	450		1B
	44%大滅松乳劑	1000		1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	13.5%納得亞滅寧乳劑	1000	6	1B
	50%陶斯松可溼性粉劑	1500	7	1A, 3A
	5%護賽寧溶液	1500	9	3A
	40%益滅賽寧可溼性粉劑	2500	12	1B, 3A
	25%芬諾克可溼性粉劑	2000	12	7B
	25%陶斯寧乳劑	1000	14	1B, 3A
	1%賽洛寧可溼性粉劑	1600	14	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	4000	14	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	4000	14	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	4000	14	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	4000	14	3A
	50%培丹可溶性粉劑	1000		14
	25%硫滅松乳劑	500		1B
	50%益滅松可溼性粉劑	500		1B
	40%免扶克水懸劑	1200	20	1A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	10	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	10	3A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500		1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500		1A
	25%納乃得水溶性粉劑	900		1A
	30%福隆納乃得水懸劑	1500	20	15, 1A
	25%佈飛賽滅寧乳劑	1000	21	1B, 3A
	10%毆殺滅溶液	350	7	1A
	11.7%賜諾特水懸劑	4000	6	5
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	20	15
葉蟎類	50%馬拉松乳劑 + 95%礦物油乳劑	800 + 95	14	1B
	95%礦物油乳劑	95	-	
	99%礦物油乳劑	500	-	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	10%依殺蟎水懸劑	4000	6	10B
	20%畢達本水懸劑	3000	6	21A
	20%畢達本可溼性粉劑	3000	6	21A
	5%合賽多乳劑	2000	9	10A
	10%芬普寧乳劑	1500	10	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	750	10	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	750	10	3A
	39.5%扶吉胺水懸劑	1500 2000	9 10	29 ,C5
	13%芬普毆蟎多水基乳劑	1000	15	21A, 12C
	5%芬普蟎水懸劑	2000	15	21A
	45%佈賜芬蟎水懸劑	2500	15	10A, 12B
	10%合賽多可溼性粉劑	4000	20	10A
	35%芬硫克乳劑	1500	20	
	18.3%芬殺蟎水分散性乳劑	3000	21	21A
	10%芬殺蟎乳劑	1500	21	21A
	15%芬殺蟎水分散性乳劑	2500	21	21A
	7.5%合賽芬普寧乳劑	1500	21	10A, 3A
	46.5%愛殺松乳劑	800	30	1B
	46.5%愛殺松水基乳劑			
	4%畢汰芬水懸劑	3000	25	21A
	25%新殺蟎乳劑	500		12C
	25%蟎離丹可溼性粉劑	500		UNB
	20%三亞蟎乳劑	1000	18	19
	50%芬佈賜可溼性粉劑	2000	60	12B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	30%毆蟎多可溼性粉劑	1000		12C
	57%毆蟎多乳劑	1500		12C
	57%毆蟎多水基乳劑	1500		12C
	42%克芬蟎水懸劑	3000	30	10A
	10%得芬瑞可溼性粉劑	3000	9	21A
	30%賜派芬水懸劑	5000	金桔、金柑 12 天 (其它 6 天)	23
	20%賽芬蟎水懸劑	3000	15	25
	50%芬佈賜可濕性粉劑	2000	60	12B
	50%芬佈賜水懸劑	2000	60	12B
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	20	15
銹蟎	50%馬拉松乳劑 + 95%礦物油乳劑	800 + 95	14	1B
	20%畢達本可溼性粉劑	3000	6	21A
	20%畢達本水懸劑	3000	6	21A
	42%克芬蟎水懸劑	3000	30	10A
	95%可溼性硫磺可溼性粉劑	100	-	M2
	80%可溼性硫磺水分散性粒劑	85	-	M2
	80%可溼性硫磺可溼性粉劑	85		M2
	90%可溼性硫磺可溼性粉劑	85	-	M2
	75%可溼性硫磺水分散性粒劑	80	-	M2
	27.5%石灰硫黃溶液	800-1200	3	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2%阿巴汀乳劑	2000	6	6
	2%阿巴汀水基乳劑	2000	6	6
	10%毆殺滅溶液	350	7	1A
	25%丁基加保扶可溼性粉劑	1000	12	1A
	50%汰芬隆可溼性粉劑	1 000	15	12A
	50%汰芬隆水懸劑	1 000	15	12A
	50%加福松乳劑	1500	15	1B
	30%福隆納乃得水懸劑	1000	20	15,1A
	5%芬普蟎水懸劑	1000	21	21A
	25%新殺蟎乳劑	1000	21	un
	50%新殺福化利乳劑	2000	21	un,3A
	50%佈嘉信乳劑	1000	30	1A
	50%芬佈賜水懸劑	2000	60	12B
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	20	15
椿象類	20%大滅松乳劑	450		1B
	44%大滅松乳劑	1000		1B
	50%加保利可溼性粉劑	500	21	1A
	85%加保利可溼性粉劑	850	21	1A
薊馬類	48.34%丁基加保扶乳劑	1000	21	1A
	10%克凡派水懸劑	1000	7	13
	37%第滅達胺水懸劑	2000	30	3A, 4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	21	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	21	4A
	18.2%益達胺水懸劑	3000	21	4A
	28.8%益達胺溶液	4500	21	4A
	11.7%賜諾特水懸劑	4000	6	5
	5.87%賜諾特水懸劑	2000	6	5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	25%丁基加保扶可溼性粉劑	500	21	1A
	40%丁基加保扶可溼性粉劑	800	21	1A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	14	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	14	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	14	3A
果實蠅類	20%芬化利乳劑	2000	9	3A
	20%芬化利水基乳劑	2000	9	3A
	50%芬殺松乳劑	1000	21	1B
	※0.02%賜諾殺餌劑(噴佈於植株下半部之葉片, 每株4點)	8		5
	2.8%第滅寧水基乳劑(果實6-7分熟開始施藥, 必要時隔7天施藥1次)	1500	30	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1500	30	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1500	30	3A
	50%芬殺松乳劑	200(40公撮)	1.使用時加蛋白質水解物一公升。 2.防治果實蠅係作局部噴施於果園周圍施用, 時不得直接噴施於植株上。	1B
	95%三氯松水溶性粉劑	720(0.13公斤)		1B
毒蛾類、鳳	11.7%賜諾特水懸劑	2000	6	5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
蝶類、刺蛾類、夜蛾類	19.7% 得芬諾水懸劑	2000	14	18
	70% 得芬諾可濕性粉劑	3000	14	18
夜蛾類、毒蛾類	2.8%賽洛寧乳劑	2000	14	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	14	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	14	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	14	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	14	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	14	3A
鱗翅目害蟲	25%二福隆可濕性粉劑	1500	20	15
葉蟬	20%達特南水溶性粒劑	3000	14	4A

※賜諾殺餌劑僅可以誘殺器懸掛進行誘殺，不可噴及作物。

1. - 免定容許量。
2. 資料更新以主管機關公告為準。
3. 其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治或「農藥資訊服務網」--植物保護手冊。
4. 臺南區農業改良場病蟲害診斷服務專線：(06)5912959

1.0 版 100.04.13 整理
 1.1 版 101.04.02 更新
 1.2 版 101.07.16 更新
 1.4 版 101.12.17 更新
 1.5 版 102.04.24 更新
 1.6 版 102.08.12 更新
 1.7 版 103.03.20 更新
 1.8 版 105.01.13 更新
 1.9 版 105.04.22 更新
 2.0 版 105.06.20 更新
 2.1 版 105.10.31 更新
 2.2 版 105.12.30 更新
 2.3 版 106.02.02 更新