

## 二十七、甜 椒 炭 痘 病

學名：*Colletotrichum capsici* (Syd.) Butler et Bisby

英名：Anthracnose

病徵：

發生於甜椒果實，初期產生褐色斑點，逐漸擴大，後期病斑向下凹陷，產生許多黑色小點，為病原菌之分生孢子堆，如濕度高則分生孢子呈粉紅色。

傳播途徑：以分生孢子作為感染源，感染源藉種子及田間殘株而傳播病害。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
500g/L氟殺克敏水懸劑 (Fluxapyroxad + Pyraclostrobin)	0.35公升	2,500	病害發生初期開始施藥，每隔10天施用一次，連續二次。	採收前6天停止施藥。
23.6%百克敏乳劑 (Pyraclostrobin)	0.3-0.4公升	3,000	中果期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具口服及呼吸中等毒、眼及皮膚刺激性。 3.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區。」
22.7%腈硫醣水懸劑 (Dithianon)	1.1-1.7公升	700	發病初期開始施藥，以後每10天施藥一次，共3次。	1.因甜椒果面光滑，須加展著劑，以增強藥效。 2.採收前4天停止施藥。

