

## 六、草 皮 雜 草

藥劑名稱	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項	防除對象
75%合速隆 水分散性粒劑 (Halosulfuron-methyl)	0.3 公斤	每公頃用 水量 1,500 公升	雜草生育初期均勻 噴施於雜草植株上 。	1.適用於百慕達草 及地毯草草皮。 2.對鐵莧菜等大戟 科雜草及繖花龍 吐珠效果較差。 3.具呼吸中等毒。	短葉水蜈蚣、扁 碎莎草、香附子 、藿香薺、白花 藿香薺、通泉草 、藍豬草。
10%依速隆水懸劑 (Imazosulfuron)	4.0 公升	每公頃稀 釋至 600公升	雜草萌芽1-2葉時 或草皮剪草後7-15 天噴施。	1.限用於百慕達草 草皮。 2.限用於草皮闊葉 及莎草科雜草。 3.具中度呼吸急毒 性。	香附子、水蜈蚣 、天胡荽、野塘 蒿、通泉草、山 芥菜、一枝香、 酢醬草。
10%伏速隆 可濕性粉劑 (Flazasulfuron)	500- 750 公克	每公 頃稀 釋至 1,500 公升	雜草生育初期(草 高5公分以下)或草 皮割後15天左右噴 施。	限於百慕達草皮施 用。	飛揚草、紅乳草 、水蜈蚣、節花 路蓼。
50%滅落脫 水分散性粒劑 (Napropamide)	5公斤	用 量 600 公升/ 公頃 (120 倍)	雜草萌芽前，均勻 噴施。	限使用於百慕達草 皮。	牛筋草、馬唐草 、酢醬草、昭和 草、紫背草、毛 穎雀稗。
45%甲基砷酸納 溶液 (MSMA)	2公升	每公 頃稀 釋至 800公 升	雜草3-6葉時噴施。	限使用於百慕達草 皮。	1.牛筋草、馬唐、紅 毛草、兔兒菜、假 吐金菊、山芥菜。 2.對蜜蜂具毒性及草 食動物有毒，畜牧 區附近避免使用。
32%汰硫草乳劑 (Dithiopyr)	1.0 公升	每公 頃稀 釋至 2,000 公升	雜草萌芽前施藥。	適用於百慕達草 皮。	牛筋草、馬唐、紅 毛草、兔兒菜、 假吐金菊、山 芥菜。
10%百速隆 可濕性粉劑 (Pyrazosulfuron-ethyl)	1.5 公斤	稀釋 至600 公升	雜草1~4葉或草皮 剪草後15天左右噴 施。	限於百慕達草皮施 用。	水蜈蚣、香附子 、長柄菊。



藥劑名稱	每公頃 施藥量	稀釋 倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項	防除對象
50%快克草 可濕性粉劑 (Quinclorac)	1公斤	每公 頃稀 釋至 600公 升	毛穎雀稗5~10公 分長時，全面噴 施。	1.適用於百慕達草皮。 2.水蜈蚣發生多時 之草皮應混合 44.1% 本達隆溶 液8 l/ha。 3.施藥時添加強透 力(Citowett) 4,000 倍。	毛穎雀稗。

