

豆科作物病害 豆科作物疫病

防治(除)方法：

藥劑名稱	施藥量	稀釋 倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
63.02%鹼性 氯氧化銅 水分散性粒 劑 (copper oxychloride)	1.3-2 公 斤	400	病害發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1.避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用。 2.延伸使用藥劑。
70%鹼性氯 氧化銅 可溼性粉劑 (copper oxychloride)	1.3-2 公 斤	400	病害發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1.避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用。 2.延伸使用藥劑。
75%鹼性氯 氧化銅 可溼性粉劑 (copper oxychloride)	1-1.6 公 斤	500	病害發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1.避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用。 2.延伸使用藥劑。
85%鹼性氯 氧化銅 可溼性粉劑 (copper oxychloride)	1-1.6 公 斤	500	病害發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1.避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用。 2.延伸使用藥劑。