

李病害  
李銹病

防治(除)方法：

藥劑名稱	作用機制	施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
500 g/L 氟殺克敏水懸劑 (fluxapyroxad+pyraclostrobin)	FRAC 11+FRAC 7	0.07-0.4 公升	6,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔 10 天施藥一次。	1.採收前 21 天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。
500g/L 三氟敏水懸劑 (trifloxystrobin)	FRAC 11	0.2-0.3 公升	6,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔 10 天施藥一次。	1.採收前 18 天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。
50%三氟敏水分散性粒劑 (trifloxystrobin)	FRAC 11	0.2-0.3 公斤	6,000	開花初期開始施藥，必要時隔 10 天施藥一次。	1.採收前 18 天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。
25%克熱淨溶液 (iminoctadine triacetate)	FRAC M7	1.3-2.5 公升	800	發病初期開始施藥，必要時隔 10 天施藥一次。	1.採收前 9 天停止用藥。 2.可能引起果實發生藥斑。 3.延伸使用藥劑。