

萐苣病害

萐苣葉枯病

學 名：*Cercospora longissima* Sacc

英 名：Cercospora leaf blight

害物別名：葉斑病

病 徵：罹病時，葉片出現圓形深褐色病斑，通常於葉片呈現散佈的現象，嚴重時，整個葉片黃化乾枯。

傳播途徑：主要由風雨及噴灌水而傳播，病原菌易殘存於採收後的植株殘葉，故採收後應注意清除殘葉，以減少田間病原菌的密度。

防治方法：

任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	作用機制	施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
21.2%依滅列乳劑 (imazalil)	FRAC 3	0.8 公升	1,500	萌芽後四葉期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，共施藥二次。	採收前 12 天停止施藥。
23%三泰隆水分散性乳劑 (triadimenol)	FRAC 3	0.5 公升	2,000	萌芽後四葉期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，共施藥二次。	1.採收前 15 天停止施藥。2.具呼吸劇毒性及眼刺激性；對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用

					水取水口一定距離內之地區。」
--	--	--	--	--	----------------