

• 中文名稱：	垂茉莉
• 英文名稱：	Bridal Veil, Nodding Clerodendron
• 學名：	<i>Clerodendrum wallichii</i> Merr.
• 科名：	馬鞭草科(Verbenaceae)海州常山屬(Clerodendrum)
• 別名：	垂茉莉(雲南植物誌)，白玉蝴蝶，垂枝茉莉
• 原產地：	原產中國雲南、西藏以及尼泊爾、錫金、印度東北部、孟加拉、緬甸北部至越南中部等地。生於海拔 100~1,190 公尺的山坡、疏林中；福建、廣東、江蘇等地溫室有栽培。
• 分佈：	園藝栽培。
• 用途：	1. 觀賞用：適於庭植或大型盆栽作觀賞用，花枝及結果枝可當插花材料。
• 莖：	直立灌木或小喬木，高 2~4 公尺；小枝銳四稜形或呈翅狀，無毛，髓部充實。
• 葉：	葉片近革質，長圓形或長圓狀披針形，長 11~18 公分，寬 2.5~4 公分，頂端漸尖或長漸尖，基部狹楔形，全緣，兩面無毛；側脈 7~8 對，在表面略顯著，近邊緣弧狀網結，細脈略顯；葉柄長約 1 公分。
• 花：	聚繖花序排列成圓錐狀，長 20~33 公分，下垂，無毛，每聚繖花序對生或交互對生，著花少數，花序梗及花序軸銳四稜形或翅狀；苞片小，線形或鑽形；花萼長約 1 公分，萼管很短，裂片卵狀披針形，長 0.7~0.8 公分，果時增大增厚，鮮紅色或紫紅色；花冠白色，花冠管長約 1.1 公分，裂片倒卵形，長 1.1~1.5 公分；雄蕊及花柱伸出花冠，花絲在花後旋捲。
• 果實：	核果球形，徑 1~1.3 公分，初時黃綠色，成熟後紫黑色，光亮，通常 2 槽紋較顯著。花果期 10 月至次年 4 月。
• 特性：	垂茉莉為馬鞭草科觀花常綠灌木。又稱白玉蝴蝶，原產於中國雲南、西藏以及尼泊爾、印度等地。莖直立，高度可達 3 公尺；分枝多，幼枝方形，綠色帶紫暈。葉對生，長度約 15 公分，寬度 2.5~4 公分，倒卵形至倒披針形，葉先端尖或鈍圓，葉上半段粗鋸齒緣，下半段全緣，葉緣略帶波浪狀，葉片常下垂狀。圓錐狀的花序自枝端下垂，秋天至春天開花，花朵數可達 30 朵以上，成株開花滿樹更為壯觀；白色花瓣 5 枚，4 片白色對稱，雄蕊基部具纖毛，花蕊長伸，花朵形似白蝶，盛開時花香撲鼻。花後萼片增厚呈鮮紅色或紫紅色，上著果紫黑色，色彩豔麗亦可玩賞。果實為蒴果，橢圓球狀，徑約 0.5~0.8 公分，表面具點狀紋路，外圍包被綠色宿存萼。適合全日照與半日照環境，空氣溼度高有助於生長。介質以疏鬆排水良好且富含基質最佳，介質略乾就要澆水，以免過度乾旱造成落葉。春、夏季每季施用一次長效性肥料。繁殖使用扦插法與空中壓條法，於春、夏季進行。未來植株成長瘦高，適合 1 尺以上盆器種植或直接種植於地面，必要時可立支柱支持細瘦的枝幹。栽培地點需避風，以免花朵、花蕊受強風吹襲受損。本種小枝、花序梗及花序軸銳四稜形或翅狀等特徵，易與相近種長葉大青 <i>Cl. longi-limbum</i> P'ei 和南垂茉莉 <i>Cl. henryi</i> P'ei 區別。

<http://kplant.biocore.tw/%E5%9E%82%E8%8C%89%E8%8E%89/%E5%9E%82%E8%8C%89%E8%8E%89.htm>

秋季盛花後，可酌加修剪長伸的枝條，開完花的下垂乾掉  
枝幹剪掉