



花胡瓜、胡瓜病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
苗立枯病	30%殺紋寧溶液	1000	苗期使用	A3
	45%殺紋依得利可溼性粉劑(2 公克/平方公尺或 100 毫升/株)	1500	苗期使用	A3,F3
疫病	2.5%右滅達樂粒劑		苗期使用	A1
	66.5%普拔克溶液	400	苗期使用	28
	35%依得利可溼性粉劑	2000	6	F3
	25%依得利乳劑	1500	6	F3
	50%達滅芬可溼性粉劑	3000	6	F5
	60.8%氟比拔克水懸劑(務必全株均勻噴濕，包含莖基部)	1000	21(設施 27)	43,28
	9.4%賽座滅水懸劑	3000	3	21,C4
	1x10 ⁷ cfu/g 蓋棘木黴菌可溼性粉劑	2000	定植前 7 天/定植 當天	
露菌病	50%枯草桿菌可溼性粉劑	800	-	
	17.7%安美速水懸劑	4000	3(設施 9)	C4
	9.4%賽座滅水懸劑	3000	3	C4
	75%免得克絕可溼性粉劑	750	3	M3,nn0 1
	75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1000	3	M3,B3
	77.5%嘉賜銅可溼性粉劑	1000		M1
	39%硫酸快得寧可溼性粉劑	400	4	M1
	55%脞硫醌銅可溼性粉劑	500	6	M9,M1
	64%甲鋅毆殺斯可溼性粉劑	400	6	M3,A1
	75%四氯異苯脞水分散性粒劑	500	7	M5
	23%亞托敏水懸劑	2000	6	C3
	10%亞托敏水懸劑	900	6	C3
	250 g/L (25% W/V) 亞托敏水懸劑	2000	6	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	4500	6	C3



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	70%四氯賽得可溼性粉劑	800	6	M5,UN02
	75%四氯異苯腈可溼性粉劑	500	7	M5
	40%四氯異苯腈水懸劑	1000	7	M5
	58%鋅錳滅達樂可溼性粉劑	400	7	M3,A1
	53%鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	400	7	M3,A1
	80%錳乃浦可溼性粉劑	400	7	M3
	72%波爾多可溼性粉劑	400	3	M1
	80%福賽快得寧可溼性粉劑	1500	9	M1,un02
	50%達滅芬可溼性粉劑	3000	6	F5
	80%快得寧可溼性粉劑	1500	12	M1
	54%快得滅達樂可溼性粉劑	400	6	M1,A1
	39.5%普拔克溶液	400	15	28
	66.5%普拔克溶液	800	15	28
	66.5%普拔克溶液	700	定植當日 (浸漬穴盤苗)	28
	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	21(設施27)	43,28
	27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	3	M1
	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	21(胡瓜), 6(小黃瓜)	B5,F4
	80%免得爛水分散性粒劑	500	6	M3
	560g/L 四氯托敏水懸劑	1000	7(設施13)	11,M5
	250g/L 曼普胺水懸劑	2500	6(設施12)	40, F5
	35%達滅克絕可溼性粉劑	1500	6(設施12)	F5,27



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	525g/L 達滅脫定水懸劑	1000	6	40, F5,45,C8
	34% 鹼氯氫氧銅水懸劑 (Copper Oxychloride+Copper Hydroxide)	600	-	M1
白粉病	99%礦物油乳劑 (兼防蟎類)	500	-	
	125g/L(12.5%w/v)亞派占乳劑	2000	3	
	80%碳酸氫鉀可溶性粉劑	1000	-	
	21.4%硫酸銅水懸劑	500	6	M1
	10.5%平克座乳劑	3000	3	G1
	30%賽福座可溼性粉劑	3000	3	G1
	12%邁克尼乳劑	4000	3	G1
	11.76%芬瑞莫乳劑	10000	3	G1
	25%布瑞莫乳劑	3000	3	A2
	50%白克列水分散性粒劑	2500	6	C2
	25%依瑞莫水懸劑	1500	7	A2
	5%三泰芬可溼性粉劑	2000	3	G1
	25%蟎離丹可溼性粉劑(兼防蟎類)	1000	7	12B
	84.2%三得芬乳劑	3500	9	G2
	5%菲克利水懸劑	2000	14	G1
	18.4% 賽福芬胺水分散性粒劑 (triflumizole+cyflufenamid)	2000	6	3,G1,U6,un11
500 G/L (50%W/V)氟殺克敏水懸劑	5000	5	C2,7,C3,11.	
細菌性斑點病	40%銅快得寧可溼性粉劑	500	3	M1
炭疽病	70%四氫保淨可溼性粉劑	500	6	M5,B1
	22.7%脞硫醯水懸劑	700	7	M9
蔓枯病	11.3%保粒黴素(丁)水分散性粒劑	2000	-	H4



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%撲滅寧可溼性粉劑	2000	15	E3
	23%亞托敏水懸劑	4000	6	C3
	47%保粒保淨可溼性粉劑	1000	6	B1
	21.2%依滅列乳劑	2000	6	G1
	3%甲基多保淨軟膏劑		6	B1
地下線蟲	10%毆殺滅粒劑 (限種植前使用)	20-40 kg/ha		1A
	5%毆殺滅粒劑 (移植當日將藥劑條施於15公分深之植溝內，覆土後定植。限種植前使用，生長期不可施用。)	40-80 kg/ha		1A
瓜實蠅	85%克蠅香混合溶液 (誘殺雄成蟲)		(1)每公頃懸掛誘殺器10~20個,5公撮藥/個。	Ia
	95%克蠅溶液 (誘殺雄成蟲)		(2)瓜類生育及開花期間可使用。(3)每隔兩星期更換一次。(4)克蠅原液與「58%乃力松乳劑」或「50%芬殺松乳劑」混合比例克蠅:農藥=10:1。	Ia
	25%馬拉松可溼性粉劑+蛋白質水解物	400	7	
夜蛾類	50%馬拉松乳劑 (幼苗及溫室栽培避免使用)	500	4	1B
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	6	6
	2.15%因滅汀乳劑	2000	6	6
葉蟎類	1%密滅汀乳劑	1500	3	6
	15%亞醯蟎水懸劑	1500	21	20B
細蟎類	5%芬普蟎水懸劑(避免與石灰硫磺劑混用)	2000	7	21A
蚜蟲類	25%派滅淨可溼性粉劑	2000	6	9B
	50%派滅淨水分散性粒劑	4000	6	9B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	10%氟尼胺水分散性粒劑	4000	3	9C
	6%苦參鹼溶液	1500		
粉蟲類	0.5%可尼丁粒劑 (定植前 3 天施於植穴)			4A
	16%可尼丁水溶性粒劑	3000	9 斑潛蠅、蚜蟲	4A
	25%派滅淨可溼性粉劑	1200	6	9B
	11%百利普芬乳劑	1,000	9	7C
	11%百利普芬水基乳劑	1,000	9	7C
	9.6%益達胺溶液	1500	6	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	6 夜蛾類	4A
	100g/L賜派滅水懸劑	1000	7	23
	150g/L賜派滅水分散性油懸劑	1500	7	23
薊馬類	9.6%益達胺溶液	1500	6	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	6	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6	4A
	43%佈飛松乳劑	1000	10 斑潛蠅、夜蛾類、金花蟲類	1B
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	3	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	4500	3	5
	80%賜諾殺可濕性粉劑	32000	3	5
	1%賽洛寧可溼性粉劑	700	7	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	7	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	7	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	7	3A
2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	7	3A	
2.5%賽洛寧微乳劑	2000	7	3A	
鱗翅目害	40%納乃得水溶性粒劑	1500	7	1A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
蟲及金花 蟲類	25%納乃得水溶性粉劑	800	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	7	1A

1. - 免定容許量
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 100.04.13 整理
 1.1 版 100.09.06 整理
 1.2 版 100.10.13 整理
 1.3 版 101.03.29 更新
 1.4 版 101.07.13 更新
 1.5 版 102.04.23 更新
 1.6 版 103.08.13 更新
 1.7 版 105.02.03 更新
 1.8 版 105.04.22 更新
 1.9 版 105.06.06 更新
 2.0 版 105.10.31 更新
 2.1 版 106.01.11 更新