

## 韭菜園雜草

防治(除)方法：

藥劑名稱	施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項	防除對象
38.7%施得圃膠囊懸著劑 (pendimethalin)	3 公升	700	畦面雜草萌芽至 1-2 葉時將藥劑均勻全面噴施。	1.施藥時田間應保持濕潤狀態。 2.延伸使用藥劑。	鵝兒腸、小葉灰藿、牛筋草、節節花、滿天星、野萵、龍葵、馬齒莧。
17.5%伏寄普乳劑 (fluzifop-P-butyl)	1.5 公升	每公頃稀釋至 600 公升	定植後雜草萌芽至 3-6 葉(10 公分以內)時施藥。	延伸使用藥劑。	禾本科雜草。
34%施得圃乳劑 (pendimethalin)	3.5 公升	600	畦面雜草萌芽至 1-2 葉時將藥劑均勻全面噴施。	1.施藥時田間應保持濕潤狀態。 2.延伸使用藥劑。	鵝兒腸、小葉灰藿、牛筋草、節節花、滿天星、野萵、龍葵、馬齒莧。
23.5%復祿芬乳劑 (oxyfluorfen)	1 公升	800	栽培後均勻噴施於畦面。	延伸使用藥劑。	小葉灰藿、牛筋草、馬唐草、野萵、馬齒莧、節節花、滿天星。