

草皮雜草

| 藥劑名稱                                 | 每公頃施藥量     | 稀釋倍數(倍)               | 施藥方法                             | 注意事項   |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| 50% 快克草 可溼性粉劑 (quinclorac)           | 1 公升       | 每公頃稀釋至 600 公升         | 毛穎雀稗 5~10 公分長時，全面噴施。             | 1.適用於百慕達草皮。<br>2.水蜈蚣發生多時之草皮應混合 44.1% 本達隆溶液 8 l/ha。3.施藥時添加加強透力 (Citowett)4,000 倍。 |
| 10% 百速隆 可溼性粉劑 (pyrazosulfuron-ethyl) | 1.5 公斤     |                       | 剪草後施藥。                           | 限於百慕達草皮施用。   |
| 32% 汰硫草 乳劑(dithiopyr)                | 1.0 公升     | 每公頃稀釋至 2000 公升        | 雜草萌芽前施藥。                         | 適用於百慕達草皮。  |
| 50% 滅落脫 水分散性粒劑 (napropamide)         | 5 公斤       | 用水量 600 公升/公頃 (120 倍) | 雜草萌芽前，均勻噴施。                      | 限使用於百慕達草皮。   |
| 10% 伏速隆 可溼性粉劑 (flazasulfuron)        | 500-750 公克 | 每公頃稀釋至 1500 公升        | 雜草生育初期(草高 5 公分以下)或草皮割後 15 天左右噴施。 | 限於百慕達草皮施用。   |
| 10% 依速隆 水懸劑 (imazosulfuron)          | 4.0 公升     | 每公頃稀釋至 600 公升         | 雜草萌芽 1-2 葉時或草皮剪草後 7-15 天噴施。      | 1.限用於百慕達草草皮。2.限用於草皮闊葉及莎草科雜草。3.具中度呼吸急毒性。  |
| 75% 合速隆 水分散性粒劑 (Halosulfuron-methyl) | 0.3 公斤     | 每公頃用水量 1500 公升        | 雜草生育初期均勻噴施於雜草植株上。                | 1.適用於百慕達草及地毯草草皮。<br>2.對鐵莧菜等大戟科雜草及繖花龍吐珠效果較差。<br>3.具呼吸中等毒。                         |
| 10% 百速隆 水懸劑 (pyrazosulfuron-ethyl)   | 1.5 公升     |                       | 剪草後施藥。                           | 1.限於百慕達草皮施用。<br>2.變更安全劑型。  |