落花生園雜草(紅字為無許可證)113.08.12

藥劑名稱	作用機制代碼	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
12% 樂滅草乳劑 (oxadiazon)	HRAC 14	5 公升	200	播種覆土後於土壤濕潤時將藥劑噴施於土壤表面。	
34% 施得圃乳劑 (pendimethalin)	HRAC 3 系統性	5-6 公升	180-200	播種覆土後，雜草萌芽前全面噴於土面。	
10% 拉草 粒劑(alachlor)	HRAC 15 系統性	20-24 公斤		播種覆土後將藥劑均勻撒佈於土表上。	
20% 西殺草乳劑 (sethoxydim)	HRAC 1 系統性	2 公升	500	禾本科雜草萌芽後 2～3 葉時全面噴施。	對闊葉類雜草無效。
5% 快伏草 乳劑(quizalofop-P-ethyl)	HRAC 1 系統性	1.5 公升	660	禾本科雜草 3～6 葉時全面噴施。	
13.2% 剋草同乳劑 (clethodim)	HRAC 1 系統性	0.8 公升	稀釋至 600 公升	禾本科雜草 3-6 葉時全面噴施。	僅對禾本科雜草有效。
12.5% 西殺草乳劑 (sethoxydim)	HRAC 1 系統性	2 公升	600 公升/公頃	禾本科雜草 3-5 葉時，全面噴施。	僅對禾本科雜草有效。
37% 本達亞喜芬 溶液 (bentazon + acifluorfen (sodium salt))	HRAC 14+HRAC 6	2 公升	稀釋至 600 公升	落花生 5-7 葉時全面噴施。	1.稀釋時加環殺草 10.9%乳劑 2.4 公升。 2.施用初期稍有黃化，維持土壤濕潤 7 至 10 日可恢復生長。
45.1% 拉草 乳劑(alachlor)	HRAC 15 系統性	4-5 公升	200-300	播種覆土後施藥。	
17.5% 伏寄普乳劑(fluazifop-P-butyl)	HRAC 1 系統性	1 公升	每公頃稀釋至 1,000 公升	禾本科雜草 3-6 葉時，將藥劑均勻噴施於雜草上。	1.宜使用在禾本科雜草較多之田區。適用於乾豆。 2.延伸使用藥劑。

38.7% 施得圃膠囊懸著劑 (pendimethalin)	HRAC 3 系統性	4.5-5.4 公升	200-250	播種覆土後，雜草萌芽前全面噴於土面。	延伸使用藥劑。
960 g/L (96% w/v) 左旋莫多草 乳劑(S-metolachlor)	HRAC 15 系統性	1.2 公升	稀釋至 600 公升	播種覆土後，將藥劑噴於土壤表面。	1.施用時土壤需要潮濕，如土壤乾燥時，施藥後輕輕拌土或鬆土，可增加藥效。2.具呼吸中等毒性，中度眼刺激性及強度過敏性。3.對水生物具中等毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離之地區」。