



北蕉 (Pei-Chiao)



一、來源

乃於清乾隆年間（1736-1795）從中國華南地區引入，距今約 250 年。至今仍為本省香蕉最重要栽培種。

二、植株性狀

1. 植株高大，高約 270 公分，莖周約 70 公分，假莖圓柱形、綠帶褐色。
2. 葉呈長橢圓形，長約 210 公分，寬 88 公分，葉型比約為 2.38。
3. 花呈指狀排列，外披紫紅色苞片。開花後，雄花苞片部分殘留。
4. 果形略呈弓形，果指長 20~25 公分，平均指重約 186 公克。果皮成熟時黃色，偶有青丹發生。肉淡黃色，細緻香甜。每株果重約 25 公斤。

三、園藝特性

1. 生長習性：植株發育迅速。新植後的十二個月可採收，宿根生育期較短。平均吸芽數約 7~8 枚。
2. 適應性：「北蕉」適應性廣，在本省無霜地區均可種植。以土層深厚、排水良好之蕉園為佳。目前栽培地區遍佈中、南及東部各蕉區。
3. 抗病性：對黃葉病第四生理小種不具抗病性。

四、栽培管理要點

1. 不抗黃葉病，不宜在病園種植。可在新地或經兩年水稻輪作之田種植。
2. 在 3~5 月以吸芽或組培苗種植，翌年 2~6 月採收，風味最佳，適合外銷。



3. 因植株高大，颱風季節切須插立防風支柱，減少風害損失。
4. 肥料以四號複合肥(11:5.5:22)較適合。每年每株約1.5~2.0公斤，不宜多施。
5. 雨季注意排水；旱季切須灌溉，保持土壤水份。
6. 注意葉部病害(黑星病及葉斑病)防治。
7. 終花後，進行疏果及套袋保護果房。為防日燒及青丹，宜用黃色，內層平滑之紙套袋。

