

梅-病害

病害名稱	藥劑名稱	稀釋倍數	注意事項
黑星病	15%易胺座可濕性粉劑 (Imibenconazole)	1500	採收前 6 天停止施藥
	11.76%芬瑞莫乳劑 (Fenarimol)	4000	採收前 21 天停止施藥
	37%護矽得乳劑 (Flusilazol)	6000	採收前 9 天停止施藥
	25%比多農可濕性粉劑 (Bitertanol)	5000	採收前 9 天停止施藥
	40%滅派林水懸劑* (Mepanipyrim)	4000	採收前 9 天停止施藥
	39.5%扶吉胺水懸劑* (Fluazinam)	3000	採收前 9 天停止施藥

	30%賽福座可濕性粉劑* (Triflumizole)	4000	採收前 12 天停止施藥
	38%白列克敏水分散性粒劑* (Pyraclostrobin +Boscalid)	1500	採收前 15 天停止施藥
	50%三氟敏水分散性粒劑* (Trifloxystrobin)	5000	採收前 18 天停止施藥
	50%克收欣水分散性粒劑* (Kresoximmethyl)	5000	採收前 6 天停止施藥
白粉病	40%邁克尼可濕性粉劑 (Myclobutanil)	8000	採收前 6 天停止施藥
	37%護矽得乳劑 (Flusilazol)	8000	採收前 21 天停止施藥
	30%賽福座可濕性粉劑* (Triflumizole)	3000	採收前 12 天停止施藥

	35.15%銅合硫磺水懸劑* (Sulfur + Copper oxychloride)	600	採收前 6 天停止施藥
銹病	50%三氟敏水分散性粒劑* (Trifloxystrobin)	6000	採收前 18 天停止施藥
	25%克熱淨溶液* (Iminoctadine triacetate)	800	採收前 9 天停止施藥
炭疽病	39.5%扶吉胺水懸劑* (Fluazinam)	2000	採收前 9 天停止施藥
	23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	2000	採收前 9 天停止施藥
	23.7%依普同水懸劑* (Iprodione)	800	採收前 12 天停止施藥
	23.6%百克敏乳劑* (Pyraclostrobin)	3000	採收前 15 天停止施藥
	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑* (Iminoctadine tris (albesilate))	1500	採收前 12 天停止施藥

25.9%得克利 水基乳劑* (Tebuconazole)	1500	採收前 21 天停止施藥
50%三氟敏水分散性粒劑* (Trifloxystrobin)	4000	採收前 18 天停止施藥
50%克收欣水分散性粒劑* (Kresoximmethyl)	2000	採收前 6 天停止施藥