

金柑 全年12月份栽培管理作業曆

月份	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
生育時期	春梢萌發及花芽分化期			花期、幼果期及果實肥大期			中大果期			果實轉色及果實採收期		
栽培管理	一、採收後清園 二、整枝修剪(冬季修剪) 1. 樹冠下位與枯病枝條的剪除 2. 調整大枝條空間分配 3. 粗大枝條分年度修剪 3. 樹冠中央進行中強度疏剪		※生長期修剪(夏季修剪) 1. 修剪器械消毒 2. 剪除樹冠內直立枝、下垂枝、交錯枝、平行枝等無用枝條 3. 及早剪除不定芽及徒長枝 4. 傷口防護		※防颱準備 1. 清園、挖溝或埋設排水管 2. 果園迎風面架設破風網 3. 植株逆風面以輪胎支撐 4. 颱風前施用亞磷酸以誘導植株抗病性		一、地面進行覆蓋以減少落果 二、動物危害處理 1. 植株上方可懸掛反光條與光碟片來防鳥害 2. 果園周圍可用上層絲瓜網、下層硬質塑膠網防猴及山豬		一、果實採收 1. 儘量晴天採收,不得已雨天採收需儘快吹乾 2. 以二刀法採收將果梗修齊,並輕採輕放果實 二、果實採後處理 1. 加強果實選別與分級,果實運移時加強防護 2. 以PE塑膠布包覆果實籃框,並儲藏於0~5°C		※採收後期防治 採收後期拉長2次採收間的日數並挑選安全採收期短之藥劑作防治	
肥培管理	每公地施用100公斤低氮磷鉀有機質肥料											
	每株施用1-2公斤39號複合肥料,或300-600公克的尿素及1-2公斤的過磷酸鈣											
	每株施用100-200公克尿素、1公斤過磷酸鈣、0.5-1公斤硫酸鎂及少量微量元素											
	植體葉片取樣											
	視葉片分析結果補充,葉面噴施 2%過磷酸鈣;視土壤分析結果補充,每株施用500公克氯化鉀,每2-4周一次											
月份	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
生育時期	春梢萌發及花芽分化期			花期、幼果期及果實肥大期			中大果期			果實轉色及果實採收期		
病蟲害防治	病蟲害防治尤重清園作業,自採收結束後配合整枝修剪,剪除病蟲危害枝葉、密生枝、黃葉枯枝 全年再維持清除果園雜草、落葉、落果、枯枝、爛果和殘果。											
介殼蟲	全年發生,確實清園,剪除有蟲枝條、不必要的新梢及太過茂密的枝葉,採收結束後及春夏芽萌發前防治要徹底											
蚜蟲	確實清園,於春夏芽萌發時施藥防治,並懸掛黃色黏紙,降低果園內蟲口密度											
潛葉蛾	剪除不必要之幼嫩枝梢或徒長枝,春夏芽萌發時注意防治,在發生初期防治效果最大											
薊馬	春梢開花、著小果前,要特別注意薊馬之防治,可放置黃、藍色黏紙誘殺監測											
天牛	應提早處理,減少其危害發生,5月份開始為天牛產卵期,為防治之關鍵期											
葉蟬	確實清園,於春夏芽萌發時開始防治,發現葉蟬密度達每葉5隻時開始防治,藥劑宜輪流使用,避免產生抗藥性											
銹蟎	連續高溫乾旱利於銹蟎生長,春芽萌發後若遇連續高溫時注意開始防治,乾旱季節發生特別嚴重,夏季雨水有無為其是否猖獗為害之關鍵											
東方果實蠅	確實配合區域共同防治,全年懸掛含毒甲基丁香油或蛋白質水解物誘蟲器與黏紙,8月正值不同夏季水果之採收期,需特別注意東方果實蠅防治											
疫病	妥善管理果園,割草時或噴殺草劑時,注意勿傷到樹幹基部;颱風或連續降雨過後易發生,故在雨季來臨前、雨後或降雨空檔時施用亞磷酸預防											
瘡痂病	勿施過量氮肥,於花苞將開放時及結小果時注意防治											
黑點病	注意果園衛生,剪除病枯枝,修剪整枝,使植株通風良好,日照充足,4-6月海雨季前後為防治關鍵期											
潰瘍病	剪除發病枝葉,清除雜草,並將罹病枝葉燒毀,颱風過後會加劇發生											

■ 病蟲害發生盛期 ▲ 防治關鍵期



整枝修剪



防颱準備




地面覆蓋



二刀法採收



土壤採樣



植體葉片採樣



植體葉片採樣



果實採樣



葉蟎(紅蜘蛛)



蚜蟲、木蝨



潛葉蛾



柑橘星天牛