

十株)。

單株平合種植法雖亦可採用，但豪雨期之表土沖刷及合壁之保衛問題等須留意，植穴以五×五×四·五公尺為理想。

(二)麻豆文日之內銷尚佳，就中南部一帶因可在農曆八月十五日(中秋節)以前採收，價值較高。

每株產量為：五、十年生四十個，十一、十五年八十個。十六、二十年生一百二十個。老株所產果實，雖品質較佳，但因果形小，果皮薄，重量較輕之故，一般以粒數來計算，幼株產果即以重量為計算單位。近年每斤或每粒約三元左右。亦有相當量之外銷。

(三)麻豆文日雖樹勢旺盛，耐粗放栽培，但過於放任不管理時，易發生煤病、象皮病、潰瘍病及介殼蟲等嚴重病蟲害，減低產量並縮短壽命。麻豆文日以白肉種為純種。苗木繁殖地不限於麻豆鎮內。惟接穗必須從優良母樹上採取。

(四)有關文日栽培之資料甚少，可參考「臺灣農業便覽」。(翁仁祿)

套袋檸檬果收前十日去袋

愛文品種九分熟即採收

【問】：(一)我高接、愛文、海嶺、吉祿等檸檬七十多株，因當地每年農曆四月開始下雨，無法噴藥，故用套袋法以舊肥料紙袋掛上，但至成熟時色澤不紅，全部都是青色，乃改用塑膠袋將全部果實套上，並將下面兩角剪除以透空氣及排除水分。但愛文色較艷，其他一部分外表亦艷，但內部果肉全青色，且果實有龜裂約佔三成之多，其中以「愛文」居多，是否套塑膠袋之故，有無可防止或減輕損失的方法？

(二)陸續成熟的果實約在八分熟就採收，因怕龜裂果多，故摘下來用電石堆色是否可行？(高雄縣鳥松鄉烏松村松埔北巷五號何碧雲)

【答】：(一)為保護愛文檸檬品質，可行套袋。惟應於採收前十日取除，以使果色轉化。至於果實常有裂開，係因土壤及果實本身一時水分過多，溫度太高，濕度大而引起裂果。如能疏通園地排水，同時採收前先去套袋，使其通風散熱，可能有所改進。

(二)果實至八分熟時，可先採下再用電石追熟出售。惟愛文品種，因糖度較低，如太早採收追熟，其風味不佳，因此該品種須九分熟採收後追熟為宜(王兆全)

蔬 菜

一期稻後種「立秋」胡瓜

播種至收完約須七十天

【問】：(一)我想在士林鎮山邊，第一期水稻收穫後，播種胡瓜(刺瓜)是否適宜？

(二)種臺北雜交二號是否適宜？或其他優良的品種，何處有售？

(三)種植到收穫約多少日？收穫後適種何種菜蔬？

(四)寶刊十六卷十期十七頁有「改良青皮」胡瓜，種子何處有售？(臺北市迪化街二段一九〇巷十二號魏份)

【答】：(一)第一期水稻收穫後，以播種「立秋種」較宜。

(二)臺北雜交二號胡瓜適於春二、三月播種。

(三)立秋種自播種至收穫需四十五天，收穫期約二十八天，合計需七十天左右，胡瓜收完後請種甘藍或花椰菜。

(四)「改良青皮」胡瓜種子，臺中縣新社鄉大南村種苗繁殖場有出售種子，「改良青皮」適於一、二月播種。(王進生)

刺瓜·苦瓜適種砂壤土

發芽七及十天施肥一次

【問】：(一)砂質土壤是否適合種植刺瓜或苦瓜？

(二)這兩種瓜，自發芽後大約每隔幾天施肥一次？

(三)這兩種瓜，在雨季種植是否適宜，花期雨量過多有無影響？

(四)高麗菜在雨季能不能種植？何品種生

正豐農藥



商標 註冊 誠懇 服務 品質 優良

各種 病虫害特效藥

稻熱病	可美農	乳劑	登記証680
	西樂生	石灰	登記証132
紅蜘蛛	殺蟬靈	乳劑	登記証875
蚜虫	利果松	乳劑	登記証816
稻苞虫	正豐松	乳劑	登記証506
稻螟虫	美粒松	乳劑	登記証225
飛虱	特殺松	乳劑	登記証350
浮塵子	能特師	乳劑	登記証322
紋枯病	新滅菌	液劑	登記証511
	阿蘇仁	可濕性粉劑	登記証235

正豐化學股份有限公司

峰三 霧六 縣中 電話