

堆肥就播種是否可以？

【問】：(一)牛糞根分叉是何原因？要如何防止？
(二)何時最適合播種？管理上注意何事？

【答】：(一)牛糞根分叉原因有二：(1)粘質土或施用未熟堆肥，致發生絞根。(2)基肥多用化肥，致傷幼苗根。(3)金針蟲、金龜幼蟲及線蟲等為害。(4)採用舊種子。如能避免上列四原因，可減少絞根發生。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

樹果

五月至採果以前

葡萄不宜中耕除草

工作？

【問】：(一)葡萄園當果實採收後應作何工作？

【答】：(一)葡萄園當果實採收後應作何工作？

【問】：(一)葡萄園當果實採收後應作何工作？

【答】：(一)葡萄園當果實採收後應作何工作？

【問】：(一)葡萄園當果實採收後應作何工作？

間實行淺耕，第二次在二月以前中耕，深約十二公分，依本省栽培實際情形，五月以後至採果以前，不宜中耕除草，冬季深耕，應分次由淺及深。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

【問】：(一)牛糞之基肥為每十公畝土糞六百至一千公斤，脫脂米糠二百公斤，過磷酸鈣十公斤，草木灰六十公斤，以施行在行間為宜。行距五十一六十公分。

10000倍

※展黏之好
不可思議※

展着劑



現貨供應

特效藥!!!

火燒柑 紅蜘蛛
銹壁蟲 銹病
瘡 痂 白粉病
增進着色



現貨供應

總經銷：經華貿易股份有限公司

Certificate
No 172

台北市郵政信箱 1764 號 TEL:58680