

〔今年生之結果枝是否剪短？〕
〔難吸收日光與露水的新、舊、暗枝等，是否剪除？〕
〔梨樹應留三層枝，或二層枝或壹層枝為宜？〕

〔若留二或三層枝時，最下面一層之樹枝發育不良，而成暗枝，最上層之枝發育過旺應如何處理？〕

〔目前市面上有梨樹栽培法書籍嗎？何處有售？（彰化花壇鄉三春村後厝巷四十號顧明哲）〕

〔梨每年剪定兩次，冬季剪定在落葉後至未發芽期間舉行，一般地區多在一月間舉行，夏季剪定係在生長季節舉行。凡新枝生長旺盛，可在其長尺許時，施行摘心，夏秋均可實行。〕

〔今年生之結果枝，不宜剪短，因其花芽均在結果枝的頂端，如剪短明年即無花芽結果。〕

〔凡樹冠內日光照射不到的細細新梢枝，可酌量剪一部分，以便通光通氣，減少病蟲害的發生。〕

〔每枝梨樹留幾層枝，要看所採用整枝的方法而定。一般採用空心圓頭形整枝，則只留一層，如採用圓錐形整枝可留三層。〕

〔若留三層時，下層枝宜長於上層枝，即距地尺許先留一層，令其成四十五度角向外伸展，中間直立枝於第二年再剪短，使其生二層枝，當二層枝生長一年，則一層枝已二年，且每層枝冬季均留當年生長五十分公分剪短，因之，當三層枝養成時，冬季修剪，則一層枝長一公尺五十分公分，二層枝長一公尺，三層枝長五十分公分，故各層枝條不會變成暗枝。〕

〔梨樹栽培法不久農林廳會有出版，市面上只能買到日本專書。（朱長志）〕

〔若留二或三層枝時，最下面一層之樹枝發育不良，而成暗枝，最上層之枝發育過旺應如何處理？〕

〔目前市面上有梨樹栽培法書籍嗎？何處有售？（彰化花壇鄉三春村後厝巷四十號顧明哲）〕

〔梨每年剪定兩次，冬季剪定在落葉後至未發芽期間舉行，一般地區多在一月間舉行，夏季剪定係在生長季節舉行。凡新枝生長旺盛，可在其長尺許時，施行摘心，夏秋均可實行。〕

〔今年生之結果枝，不宜剪短，因其花芽均在結果枝的頂端，如剪短明年即無花芽結果。〕

〔酸筍之加工法簡單僅將竹筍切片後浸漬於清水中，使其自然醱酵變酸，然後略加點食鹽就可煮食，普通製造僅二三天就可食用。〕

〔市售筍干有兩種，一為純粹脫水乾燥者，無帶酸味無鹹分，為一般農家自製品為多。另如竹山、梅山等竹筍產地製造的鹹酸筍干，其製法要經煮熟、醃漬、乾燥、鹽漬等處理，醃漬時間需較久，其製品帶鹹酸味，風味頗佳。（朱仙和）〕

〔三品種母豬不可養太肥，發情二至三天最適配種。〕

〔三品種母豬之小母豬是否可留作種母豬？若可，其優點如何？若不可，其缺點又如何？〕

〔母豬的發情期是幾天？連續幾次？又每隔幾天發情一次？何時為配種最好時期？（臺東關山鎮德高里六九號阮振德）〕

〔三品種母豬留為母豬並無不可，但最好以二品種為母豬較好，在鄉村裏T B（桃園×盤克夏）一代母豬容易得手，以後再選優良公豬交配，普通是採用藍瑞斯或杜洛克公豬，就可配產三品種成為良好的肉豬。〕

〔因不知道所養的三品種小母豬是何種血統，如果是T B L應再配杜洛克或大白豬（W）等亦可，此種多品種雜交豬常有強健，生長快，飼料利用效率高，屠體品質好及售價高等優點。〕

〔三品種小母豬如要留做母豬的，應注意不要養太肥，不然生殖障礙多，影響生產。〕

〔母豬發情全期大約為五十七天，（有桃園種血統者較長）但真正之發情期（許可公豬駕乘）約為二十四天，配種最好時期為母豬許可公豬駕乘後十一三十五小時，即發情後第二至第三天。發情期間平均每隔二十一天發情一次，但有的母豬有時提前或延後一天是常見的事。（張聯欣）〕

〔三品種母豬留為母豬並無不可，但最好以二品種為母豬較好，在鄉村裏T B（桃園×盤克夏）一代母豬容易得手，以後再選優良公豬交配，普通是採用藍瑞斯或杜洛克公豬，就可配產三品種成為良好的肉豬。〕

〔因不知道所養的三品種小母豬是何種血統，如果是T B L應再配杜洛克或大白豬（W）等亦可，此種多品種雜交豬常有強健，生長快，飼料利用效率高，屠體品質好及售價高等優點。〕

〔三品種小母豬如要留做母豬的，應注意不要養太肥，不然生殖障礙多，影響生產。〕

〔母豬發情全期大約為五十七天，（有桃園種血統者較長）但真正之發情期（許可公豬駕乘）約為二十四天，配種最好時期為母豬許可公豬駕乘後十一三十五小時，即發情後第二至第三天。發情期間平均每隔二十一天發情一次，但有的母豬有時提前或延後一天是常見的事。（張聯欣）〕

〔三品種母豬不可養太肥，發情二至三天最適配種。〕

〔三品種母豬之小母豬是否可留作種母豬？若可，其優點如何？若不可，其缺點又如何？〕

〔母豬的發情期是幾天？連續幾次？又每隔幾天發情一次？何時為配種最好時期？（臺東關山鎮德高里六九號阮振德）〕

〔三品種母豬留為母豬並無不可，但最好以二品種為母豬較好，在鄉村裏T B（桃園×盤克夏）一代母豬容易得手，以後再選優良公豬交配，普通是採用藍瑞斯或杜洛克公豬，就可配產三品種成為良好的肉豬。〕

〔因不知道所養的三品種小母豬是何種血統，如果是T B L應再配杜洛克或大白豬（W）等亦可，此種多品種雜交豬常有強健，生長快，飼料利用效率高，屠體品質好及售價高等優點。〕

〔三品種小母豬如要留做母豬的，應注意不要養太肥，不然生殖障礙多，影響生產。〕

〔母豬發情全期大約為五十七天，（有桃園種血統者較長）但真正之發情期（許可公豬駕乘）約為二十四天，配種最好時期為母豬許可公豬駕乘後十一三十五小時，即發情後第二至第三天。發情期間平均每隔二十一天發情一次，但有的母豬有時提前或延後一天是常見的事。（張聯欣）〕

〔三品種母豬留為母豬並無不可，但最好以二品種為母豬較好，在鄉村裏T B（桃園×盤克夏）一代母豬容易得手，以後再選優良公豬交配，普通是採用藍瑞斯或杜洛克公豬，就可配產三品種成為良好的肉豬。〕

〔因不知道所養的三品種小母豬是何種血統，如果是T B L應再配杜洛克或大白豬（W）等亦可，此種多品種雜交豬常有強健，生長快，飼料利用效率高，屠體品質好及售價高等優點。〕

〔三品種小母豬如要留做母豬的，應注意不要養太肥，不然生殖障礙多，影響生產。〕

正豐農藥



商標 註冊 正豐 誠懇服務 品質優良

各種 病虫害特效藥

稻熱病	可美農	乳劑	登記証680
紅蜘蛛	西樂生	石灰	登記証132
蚜虫	殺蟬靈	乳劑	登記証875
稻苞虫	利果松	乳劑	登記証816
稻螟虫	正豐松	乳劑	登記証506
浮塵子	美粒松	乳劑	登記証225
飛虱	特殺松	乳劑	登記証350
紋枯病	能特師	乳劑	登記証322
	新滅菌	液劑	登記証511
	阿蘇仁	可濕性粉劑	登記証235

正豐化學股份有限公司

台中縣霧峰 電話：六三