



# 農友經驗

## 新鮮雞蛋檢查方法

不新鮮的雞蛋不但味道差而且養分也大受損失，如何來識別新鮮的雞蛋，實在是一種很重要的常識。新鮮雞蛋的檢查方法，共有五種，現簡述於後，以供參考：

(一) 振音法：此種檢查法最普遍，其法是将蛋拿到耳旁振動，新鮮蛋內容緻密，不可能移動，故無聲音，要是蛋不新鮮，便聽到聲音。

(二) 外觀法：卵壳表面粗糙有點粉狀者為新鮮蛋，若外表看來有點像沒過油的樣子，那就腐敗不新鮮了。

(三) 舌感法：新鮮的雞蛋，氣室在鈍端部，以舌觸之，便覺特別清涼，若銳端部與鈍端同感清涼，則表示氣室已他移，此蛋已不新鮮了。

(四) 比重法：新鮮雞蛋比重為一〇八至一〇九，舊蛋比重較輕，若比重在一〇二以下已將近腐敗了。

(五) 透視法：藉着電燈的光線，可透過蛋壳，看出氣室的位置，新鮮蛋氣室小，若蛋不新鮮，則氣室較大。

因此一個新鮮雞蛋必需具備下列幾個條件：①外表粗糙②振動沒有聲音③鈍端的溫度比銳端低④氣室要小⑤比重在一〇八至一〇九。(臺南縣立玉井農校陳義丁)

## 我防治蟋蟀的方法

蟋蟀性喜生長在輕鬆的砂土裏，

牠是危害瓜果類最嚴重的一種害蟲，蟋蟀在溫和暖照的氣候下危害最烈，常咬斷瓜果的莖蔓，如從下部咬斷，整株便枯死，給農友很大的損失。

去年夏天，我栽種西瓜，遭受蟋蟀的侵害，經農會指導員的指導，介紹兩種防治方法，經我實施防治的結果，的確有效，現在我把捕殺牠的方法簡述於下：

(一) 石油捕殺法：壤土砂土亦可用此方法。下雨過後土壤溼潤，將水灌滿洞穴，然後把石油滴入水平面上二三滴，等三十秒至一分鐘後蟋蟀即爬出洞口而死亡(注意此方法，是先灌水後再滴石油才有效)。

(二) 粉劑防治法：乾燥砂土不宜用上述方法，可用藥劑防治。將作物的嫩葉沾濕後粘着DDT或BHC粉劑置入洞穴，放入洞穴的深度最少要一公分以上，然後把土塞住鑽壓洞口，以後蟋蟀要爬出洞口時，一接觸到這藥劑便會中毒死亡。(苗栗縣竹南鎮港崙里七六號蔡有仁)

## 我對蘆筍及養豬的經驗

▽蘆筍採收期間盡量減少施用過磷酸鈣即磷肥，因此要素會促使作物提早結果，所以施用會使蘆筍開花結果，減少嫩筍的生長。

▽蘆筍農友們如要削蘆筍皮時，請您把所要削皮的蘆筍浸在水裡，然後再拿起來削皮，就容易得多了。

▽如遇到豬下痢時，可以把花生(不必脫殼)放在草上燒，直至花生有香味時，連花生及草灰讓豬吃則癒。(雲林縣土庫鎮埤脚里六十五號陳欽澄)

# 日產 ★ 農藥

## 介紹新農藥


農藥登記證 827 號

# エルサン

最新低毒 有機磷劑 日產 (益農產) 乳劑



進口原裝·現貨供應



(根據日本8月24日化學工業日報記載)

## 益農產乳劑三大特點

- (1) 低毒 (如左圖)
- (2) 速効 (毒性分解很快)
- (3) 對廣範圍害蟲有確實效果

★ 請參照豐年報 16 卷 3 期 20 頁

總代理：日星實業股份有限公司

臺北市南京西路5號之1  
電話：59961~4