


洋香瓜栽培法

施・銀・行・



(下)金奧里和(上)「疏二南臺」種品良優瓜香洋

西洋香瓜味甜芬芳，肉質柔軟多汁且富營養，為一良好水果。露地西洋香瓜在澎湖稍有栽培，本島則因氣候多濕，易發病害，幾乎沒有栽培。但年來經有關機關引種改良結果，已選育出抗病優良品種，可適合本島栽培了。

摘心整枝摘果

因習性在孫蔓着果，須摘心促進着果，本葉四、五葉時，以細竹摘心端，留子蔓三、四枝，子蔓長約五十公分（約十五至十六節處）再行摘心，孫蔓着果後留下一節末端摘去。

不致枯凋之程度則可，生長盛期土壤水分過多時，植株繁茂過盛軟弱易發生病蟲害。幼出期可用水桶灌水，稍長大後以畦溝灌溉。雨天注意排水，勿使田間積水。

充分成熟時發生香味，果皮變特有之色澤及網紋，並在果實與梗的着生部發生離層，果實自行掉落，此時收穫品質最好。但如要遠途輸送，須在發生離層之前一、二天採收較耐貯運。因無後熟作用，果實着生過多影響品質很大，故須行摘果，每株留果二、三個，而在同一蔓上不可留兩個以上，留果部位以子蔓五、六節前後之孫蔓着生者為佳，較末端着生的果實雖較大，但晚熟，品質差。不留的果實應在大如雞卵之前摘除。

培土灌水收穫

西洋香瓜果皮比較軟弱，如畦面濕潤，接觸處容易腐爛，故高溫多濕時，果實下面應墊以竹環，防止腐爛，日光強烈時果皮易被灼傷，須蓋舊報紙或敷乾草。

蔓長約三十至四十公分時培土，然後敷稻草於畦面。培土須及時進行，過遲影響生長，敷草有保持土壤水分，防止果實污染及固定莖葉等效用。

生育中需水較多時期為果實肥大期及生長盛期過早，必須灌水，其餘期間需水量較少，不可灌水過多，成熟期間保持莖葉

GOSAN
高山


農藥登記證 820 號

Colloidal Wettable Sulphur
膠質可濕性硫磺粉劑



膠質硫磺可濕性粉撒於水面，可自動分散而成乳膠液可歷久不沉澱，噴霧器不必附加攪拌裝置，且無阻塞之慮。（見附圖）

具有 150 年歷史的專業硫磺粉工廠
西德 RIEDEL-DE HAEN 廠出品



「高山」膠質可濕性硫磺粉劑

- ◆ 主 治 ◆
1. 紅蜘蛛類
 2. 果樹類之瘡痂病
 3. 菸草白粉病
 4. 蔬菜類之一般病蟲害
 5. 各種植物之粉黴病

總經銷 豐華有限公司
臺北市郵政信箱 3339 號

用，過早收穫甜度低，品質差。
採收包裝在上午果實溫度較低，可減輕運輸中的損失，採收時留果梗一、二公分剪下。十公畝收量約一千二百至二千公斤。

預防兩大蟲害

瓜實蠅：俗稱瓜蜂或蜂仔，為瓜類的大害蟲，成蟲多產卵在果實內，間亦產於嫩莖組織中，孵化的幼蟲在內部蛀食，致果實腐爛，或使嫩莖被害部上端的葉葉枯凋。

在本省全年發生，夏季高溫時發生特多，其次為春秋二季，冬季較稀少。發生盛期在南部為五至十月，北部為六至九月。

幼果時及發生網紋成蟲時均易被害，嫩莖在生育初期多施氮肥，生長繁茂軟弱時易被加害。

防治法：①大面積集園栽培可減輕被害。②用水解性蛋白質和廿五馬拉松可濕性粉劑，加水四百倍於開花結果時噴射，每五至七天噴射一次。③用紙袋套果或用細草厚厚覆蓋果實。

黃守瓜：成蟲食害瓜葉，成網狀食痕，幼苗被害可致枯死，幼蟲為害根部瓜的真葉長出就噴射五〇%「賽文」可濕性粉劑五百至一千倍液。

濕度高易生病

露菌病：抗病性相當強，但氣候較寒冷，濕度高時，仍會發生，故在生育後期須注意防治。

病徵初期葉面呈黃色小斑點，後漸擴大並為淡褐色，病斑為多角形，裏面生有黑灰色霉狀物，病葉不久即枯萎。

防治法：(1)注意通風排水，(2)多施鉀肥，(3)噴射「大生銻七八」或「大生銻廿二」四百倍稀釋液，每七至十天噴射一次。

蔓割病：莖葉突然萎凋，患部蔓莖變為褐色或縱裂，滲出暗褐色脂液，很快枯死。

防治法：(1)輪作(五年以上)，(2)種子消毒，用「烏斯普龍」八百倍液浸漬三十分鐘，(3)燒毀病株，(4)土壤消毒。

萎枯病：病斑部白色乾固，上面發生黑色小顆粒，被害部上端枯死。

防治法：(1)選用無病種子，(2)保持根際部土壤乾燥，(3)噴射「大生銻廿二」四百倍稀釋液防治，每隔十天噴一次。

炭疽病：發生在果實，莖及葉部上面。如有濕氣在病斑上呈鮮肉色分泌物。

防治法：(1)種子消毒，(2)輪作(一、二年)，(3)噴射「大生銻七八」四百倍，每隔七至十天噴一次。

砂土多線蟲病

罹病株：生長衰弱，生長萎縮，莖莖節間縮短，新葉發生濃淡交互的斑點，果實發育不好，品質差。


高溫，日光強烈時發生多，土壤過乾，生長不好，亦容易發生，由蚜蟲等媒介傳染。

防治法：(1)瓜類毒素病部份會種子傳染，故要由無病株採種。(2)注意驅除蚜蟲。(3)早期發病株之拔除。(4)部份接觸傳染，故觸及病株農具或手，必須清洗再行作業。

根線蟲病：根部發生很多根瘤，嚴重時生育不良，葉片捲縮，由下部葉片變黃枯死。砂土發生較多。

防治法：(1)注意前作物、番茄、茄、胡瓜、南瓜、胡蘿蔔、豆類之後作不宜栽培。(2)發生嚴重時與禾本科作物輪作二、三年。(3)每公頃用七〇%二溴丙氯烷(DBCP)乳劑十八至廿八公升，加水若干倍，或用D—D原液二百公升，均勻注入土中處理。(完)

*大生二十二防治香蕉葉斑病



*大生二十二 美國三磅原裝

省農林廳農藥登記證第一六一號

寄即索函書明說

售出有均行藥農地各省全

理代總灣台
司公限有易貿象育
室一一七號四四一段一街日漢市台北
七七一六三、話電

標商記登司公斯哈門羅國美*