養猪

母猪發生膣脫症　可用明礬水冲洗

【問】：母猪生產後，一節生腸從陰部脫出二寸長，有時還會縮進去，有時又脫出來，這是什麼原因？是否一種疾病？有何方法治療？（臺中豐原鎮葫蘆里四二號羅思堯）

【答】：所患的病是「膣脫」症，其主要原因爲懷孕後期腹壓太高，子宮之韌帶鬆弛，併因分娩後產道及外陰部擴張或裂傷及怒責太强，致使分娩後從陰戶反轉而脫出一點，有時可脫出四—五寸長，「膣脫」有時發現於分娩前。注意猪舍內清潔不使染汚，並加以消毒，或以明礬水（五%）冲洗收斂，使其收縮，有時可自然治癒。同時應加以限制飼料量，不許吃得太飽。減少怒責。

如無效時可經麻腹後施於腰腹帶固定，或以針縫合陰唇一—二針（不許縫太緊），並加以消毒收斂陰戶，就可獲治癒。（張聯欣）

乳猪敗血症關節炎　可用配尼西林治療

【問】：㈠乳猪產後數天，有一頭後肢不能站立，關節處發腫過幾天後會發抖，發高熱（四十一度），至今體重未增加，他猪約有五公斤（生後十天）不知是何病？

㈡另有一本地種母猪生產十二頭小猪，但大小相差一倍餘，此小猪如注射綜合維他命，有否促進其生長之效果？（臺中縣大里鄉內新路三三號黃景川）

【答】：㈠乳猪產後不久後肢關節腫脹，不能站立，發抖高熱等情形，爲出生當時剪臍部沒有好好的消毒，因此細菌感染引起之初生猪敗血症、關節炎等全身病狀。此種病應使用配尼西林或混合微素治療效果很好。預防本病發生要點，分娩前猪舍要洗刷乾淨並消毒，剪臍帶前後要用碘酒丁寧消毒，麝草要用乾淨者。

●㈡所產本地母猪未知已生過幾胎，因胎兒大小的原因很多，如胎兒過多（十二頭不算很多），母猪妊娠中營養不良或有病，母猪年齡太老等，都會發生胎兒大小不齊現象，注射綜合維他命，當然有幫助生產效果，但不會很顯著，如果母猪泌乳能力很好，每一個乳房的泌乳量都平均而豐富，以後發育不會太差，但請注意(1)以人工協助，使小的仔猪吃到泌乳量最豐富的乳房，使其充分吃飽。(2)早些餵教槽飼料。(3)施行早期離乳（三十五—四十天）以後發育較齊一。（張聯欣）

樹薯可以青貯養猪

【問】：樹薯盛產期想儲藏餵猪，除作乾發外是否可以如甘藷般青貯！需儲藏幾個月？應混合何物？其比率多少？將來餵肉猪時是否有利？與地瓜比較如何？（屏東縣泰武鄉武潭村四鄰九二號傅秋義）

【答】：樹薯的貯藏普通都是採用作發晒乾貯藏，如此可耐長久貯藏，亦可以洗粉後將其粕渣晒乾貯藏，此法一舉兩得更有利。如果有地方窖藏，亦可以按地瓜甘藷等青貯法貯藏，普通加脫脂米糠（或生糠）其比率爲五比一，即樹薯五米糠一。

樹薯在山地可能比甘藷便宜，而且樹薯在養猪上的效果，亦較甘藷爲好，如果青貯，其營養分會更高，是一種很好的養猪飼料。（張聯欣）