



農友經驗

我管理柑粒的心得

柑子自三月初開花結果後，整年的生產就全部寄望在樹梢上的柑粒，所以對柑粒的管理，和葉樹的管理是一樣的重要。我對柑粒管理方面，雖然不敢說有多大認識，但我願在此將近幾年來的經驗，稍作介紹，以便作各位農友的參考。

柑子大約在三月初時候開花，在最初的二個月內，它的生長似乎很慢的，雖然長得慢，但在這段期間內的管理良好抑否，影響柑粒的價值很大。這段期間內的柑粒，似乎特別容易害病，而使柑子皮變黑，而且它的生長亦將受到很大的影響。我在這段期間內每十五日一二十日噴射一次大生七七八，同時混合銅劑波爾多液殺菌劑和展着劑及營養劑（尿素或其他營養液劑）。但有時亦因為下雨或藥力退去時，在發現時就趕快補噴上述藥液。在我過去幾年的經驗，所得到的效力記錄，可說非常的好。

到了五月（農曆）以後，因為陽光漸漸強，同時雨水也漸漸增多了，這種氣候是最容易發生病害的，且欲爭取外銷所以也加強噴射，由於柑粒的生長漸快，結果的樹枝漸重而下垂，且有許多結集在一起，所以噴藥應特別注意噴射不到的地方，銅劑波爾多液也改為間次（隔一次）噴射。同時也須將下垂的樹枝頂起，而且須將

因結集而陽光露水所不到的柑粒掉開，否則陰暗裏的葉粒生長緩慢且皮色不佳，品質也差。

因為太陽炎熱和雨水關係，另有兩種不易醫治的現象——裂果和日曬傷。

這兩種現象到現在我還未發現特效的藥劑，但在無可奈何之下，我想出較笨的方法，那就是在每次噴射時，參加些營養劑（到現在我還未發現較有效的藥劑，因為正在試驗中，不過以「綠寶」的效力為最好。）想使柑粒的發育增快，裂果現象大減，但因日曬傷並不見有效，我又想出用包裹方法來防治，因為我想所以有日曬，大概是由炎熱的陽光曝曬後，突然下了一陣大雨（西北雨），而引起的。用紙將被日光曬傷的果粒（呈黃色）包裹起來，雖然不能治好已被日曬傷的，但預防的效力是非常好的。

漸到收穫時，大生七七八及波爾多液也漸少用。在這期間內我注意到葉蠅的侵害，用甲基丁香油誘殺及富粒多噴射，可收到防止因葉蠅所害的爛葉現象。這樣，由結集至收成完畢的管理，其效果很使我滿意，所以特別介紹以供各位柑農作參考。（嘉義縣番路鄉江西村江西寮三號張光郎）



用高壓噴霧器噴藥

農藥字第 752 號

大富丹 80%可濕性粉劑 (半磅裝)
DIFOLATAN® 80% W.P. ◻ 柑桔黑星病特效

農藥字第 521 號

福爾丹 50%可濕性粉劑 (1 磅裝)
PHALTAN 50% W.P. ◻ 柑桔瘡痂病特效

農藥字第 382 號

好速殺 50%可濕性粉劑 (1 磅裝)
ORTHOcide 50% W.P. ◻ 果樹·蔬菜殺菌特效

農藥字第 138 號

殺蝸牛劑 (1 磅裝)
BUG-GETA ◻ 殺一般蝸牛特效

農藥字第 921 號

富賜靈 ◻ 各種茶蟲廣効劑
PHOSPHATE 2.0 SPRAY



製 造 廠
CHEVRON CHEMICAL COMPANY
ORTHO DIVISION U.S.A.

總代理：惠農股份有限公司
臺北市長安東路 2 段 16 號 電話 52093