

越南栽培葡萄的技術

梁文六著
蔡致謨譯

越南中部沿海的芽莊和藩郎生產葡萄，所栽品種都是屬歐洲系統，當地氣候乾燥少雨，每年只在十月至十二月有雷雨，夏乾冬濕，略與世界盛產葡萄的地中海沿岸氣候相彷彿，只是氣溫較高而已。當地葡萄農運用修剪的技巧，使葡萄一年三熟，其中二熟豐收，一熟產量較低。臺灣的氣候，夏濕冬乾，入春以後，葡萄枝梢繼續發育不已，不到秋季枝梢無法充實成熟，所以一年只能一熟，但本文中有許多地方值得吾人借鏡。

(續上期)


(3)環狀剝皮：剝去結果枝上果穗下方十公分處一圈樹皮，寬五至十公厘則養分集中，以供果穗的肥大，如此成熟的果實也較甜，而且早熟八至十天。作者曾做試驗，結果枝作環狀剝皮者，一公升葡萄汁中含糖分一百九十公克，未作環狀剝皮者一公升葡萄汁中含糖分一百六十五公克。此方法適用於晚生種和易落粒的品種。

(4)果穗修剪：剪去發育不良和過密的果穗。留存的果穗須疎除過密和發育不良的果粒。

①疎果穗：結果母枝修剪後，如遇豐年，發生的二個枝梢都是結果枝，每枝有二至三串果穗，則結果過多，負擔過重，宜在落花後一個月時修剪果穗。將發育不佳和過密者剪去，否則使植株衰弱或落果。普通一個葡萄園如管理週到，每個結果枝只留一穗果實。如發現預備枝太

衰弱，會影響次年結果時，應犧牲一個結果枝，剪除果穗，使作預備枝，另一結果枝則使結二穗果實。如結果枝很衰弱，每枝只可留一穗果實，因留二穗時結果不佳，無價值。通常基部一穗果實較早熟，美觀而好吃，但果實早壞，貯藏不久。所以一般留上方一穗，貯藏較久。

(2)疎果粒：葡萄花很小，五瓣，連接成一蓋，蓋於花上遇冷涼潮濕則蓋不能開放，花即毀壞，叫做落花或無花。如果春天天氣乾燥枝梢強壯，花延長，蓋開，就是開花，發散特殊香氣，即可結果。一株上各種花不在同時開花。疎果粒當果實如豌豆大時



圖五：結果母枝上芽的計算法

商標



註冊

正 豐 農 藥

可樂必收乳劑
疏菜類青蟲殺蟲劑
登記證三五〇七
登記證五二六
登記證三二五



大克蟲85粉劑
8E馬拉松乳劑
富米多乳劑
稻飛蟲·浮塵子特效藥
登記證五九〇
登記證七六三
登記證八三三



利果松乳劑
樂果松乳劑
益果精乳劑
紅蜘蛛·蚜蟲特效藥
登記證八一六
登記證二九五
登記證六三一



正豐化學股份有限公司

台中縣霧峰鄉草湖路二號
電話：霧峰 六三

