

# 越南栽培葡萄的技術

梁文六著  
蔡致謨譯

越南中部沿海的芽莊和藩郎生產葡萄，所栽品種都是屬歐洲系統，當地氣候乾燥少雨，每年只在十月至十二月有雷雨，夏乾冬濕，略與世界盛產葡萄的地中海沿岸氣候相彷彿，只是氣溫較高而已。當地葡萄農運用修剪的技巧，使葡萄一年三熟，其中二熟豐收，一熟產量較低。臺灣的氣候，夏濕冬乾，入春以後，葡萄枝梢繼續發育不已，不到秋季枝梢無法充實成熟，所以一年只能一熟，但本文中有些許多地方值得吾人借鏡。

(續上期)


(3) 環狀剝皮：剝去結果枝上果穗下方十公分處一圈樹皮，寬五至十公厘則養分集中，以供果穗的肥大，如此成熟的果實也較甜，而且早熟八至十天。作者曾做試驗，結果枝作環狀剝皮者，一公升葡萄汁中含糖分一百九十公克，未作環狀剝皮者一公升葡萄汁中含糖分一百六十五公克。此方法適用於晚生種和易落粒的品種。

(4) 果穗修剪：剪去發育不良和過密的果穗。留存的果穗須疎除過密和發育不良的果粒。

① 疎果穗：結果母枝修剪後，如遇豐年，發生的二個枝梢都是結果枝，每枝有二至三串果穗，則結果過多，負擔過重，宜在落花後一個月時修剪果穗。將發育不佳和過密者剪去，否則使植株衰弱或落果。普通一個葡萄園如管理週到，每個結果枝只留一穗果實。如發現預備枝太

衰弱，會影響次年結果時，應犧牲一個結果枝，剪除果穗，使作預備枝，另一結果枝則使結二穗果實。如結果枝很衰弱，每枝只可留一穗果實，因留二穗時結果不佳，無價值。通常基部一穗果實較早熟，美觀而好吃，但果實早壞，貯藏不久。所以一般留上方一穗，貯藏較久。

(2) 疎果粒：葡萄花很小，五瓣，連接成一蓋，蓋於花上遇冷涼潮濕則蓋不能開放，花即毀壞，叫做落花或無花。如果春天天氣乾燥枝梢強壯，花延長，蓋開，就是開花，發散特殊香氣，即可結果。一株上各種花不在同時開花。疎果粒當果實如豌豆大時



圖五：五個母果枝上計算的芽

商標 註冊

## 正 豐 農 藥

可樂必收  
乳劑 登記證三〇七  
乳劑 登記證五二六  
乳劑 登記證三二五



大克蟲 85  
粉劑 登記證五九〇  
馬拉松 85  
乳劑 登記證七六三  
富米多  
乳劑 登記證八三三  
稻飛蟲·浮塵子特效藥



利果松  
乳劑 登記證八一六  
樂果松  
乳劑 登記證二九五  
益果精  
乳劑 登記證六三一  
紅蜘蛛·蚜蟲特效藥



正豐化學股份有限公司 台中縣霧峰鄉草湖路二號 電話：霧峰 六三