

剪去畸形和太密的果實。果穗中間的果實即使健全，也須剪去。同時在果穗頂端的果實須剪去二、三分，因它們不易成熟，也不美觀。總之，每個果穗應剪去五分之二果粒。疎果粒宜在下午涼爽時行之。

### (九) 落果和預防

有時果實不能在樹上成熟，未熟先落，其預防法：

(1) 在初着果時宜施肥料，有石灰的土壤每一平方公尺施二十五公克硝酸鈉，無石灰的土壤施硝酸鈣二十五公克。

(2) 結果枝在果穗上方兩節處行摘心。

(3) 當乾旱時宜充分灌水，如水分不足則落果。

### (十) 套袋


果穗修剪後，宜即用紙將果穗包護，目的在防風、雨、鳥、蟲的侵害。包紙的果穗因受陽光的照射，內部溫暖，所以果實早大。用普通紙包果也比不包者早熟而甜。不要用玻璃紙，透明紙或塑膠紙包果，以防日焦。白色葡萄宜用淡黃色紙，成熟以前七天撕開紙袋，使通氣。收穫前四天將紙袋除去。

### (十一) 收穫

果實在完全成熟後採收，留在樹上愈久愈甜。靠近根部的果穗早熟，


所以宜早收。採收宜在早晨日出前。太陽出來後，天氣變熱，即停止採收。採時留一段果梗剪下，放入填碎紙的籃或木箱中，不要把果穗拿在手中，要拿時拿果梗。要想久貯，宜連五公分長的結果枝剪下，則果梗不易凋萎。宜掛在鐵絲上貯藏。

當果實成熟時，白色種的果皮呈黃或深黃色，果粒透明，望得見內部黑色種子時採收。黑色種或粉紅色種則當整個果實着色時採收。如再要肯定其熟度，可切開果實檢視，如半呈透明有很多白色膠質，即為成熟的證明。(全文完)



新更和剪修的枝母果結：六圖

證記登料飼廠林農省灣台  
號五九四〇一第字飼畜農



劑進促育肥猪肉

# ABABAB TRIPLE FAT

司公限有份股達方保  
品出營榮

號151路西權民市北台

- 使用肉猪肥育促進劑，能肥的肉猪體重，比一般重25台斤。
- 使用能肥可節省飼料，增加赤肉及肝臟。
- 目前許多養猪先進農戶均開始使用。
- 歡迎直接郵購，「定價：每(二頭份)包三十元正」郵購號碼是劃撥儲金帳號六五七三號。
- 免費供給能肥說明書，請來索取。

# 每頭猪多賺400元

項目	平均每頭在50日所需飼料	飼料市價 屏東半完全飼料50% 4.70/ky 乾樹薯 50% 3.00/ky	使用能肥	平均增加體重	增加體重換算市價(1台斤13元)	合計
(一般)普通飼法	134.5kg	517.80元	0	43斤	559元	
每日添加能肥3公分	110kg	423.50元	30元	68斤	884元	
由差額所得的利益		94.30元	扣30元		325元	389.30元