

預防：本症多屬遺傳性，原因泰半來自公猪，所以預防方法，首重找出具有遺傳性的公猪予以淘汰，或至少下次配種不可用同一公猪，以防再發生。此外狹窄的豬欄，飼養頭數太多，撲捉仔豬時過於粗暴都容易發生。

脫肛後少餵料

脫肛原因多為腸蠕動亢進，腹壓增大，運輸中或豬欄太擠，或嚴重下痢及便秘，增加努責而直腸反轉脫出在肛門外，一般人稱為「凸大腸頭」。外脫的腸管長度不一，按時間的經過，努責逐漸增加的程度，更由於括約肌的壓迫，致使外脫腸管粘膜的發生破裂出血水腫和壞死等變化。所以一發生脫肛，應即將病豬隔離加以治療，避免被別的豬隻咬破或在欄壁擦破引起流血和發炎。

治療：用鼻部固定法將豬固定，以百分之三至五明礬水沖洗患部使其收斂縮小，用手指小心的將外脫的直腸慢慢還入肛門內，壓着肛門不使再翻出，同時以較粗縫線縫合肛門二針成十字型。禁食三、四天僅供給飲水，後拆線觀察是否再脫。患過本症的豬隻暫時不可餵得太多，以促進痊癒。如果經過時間太長，脫肛部水腫嚴重陷於壞死無法還原時，可採取下面的方法。

(1) 不經任何手術僅注意隔離及護理，等待脫肛部壞死脫落，普通約需五至七天，在此期間應連續使用消炎劑，防止腹膜炎等繼發症。

(2) 可以剪去脫肛部份，將內外腸管兩端縫接，但本法屬於特殊外科技術，非一般人所能妥善處理，須請獸醫師施行。

分娩易致脫腔

張聯欣：澎湖馬公人，屏東農業學校獸醫科畢業，曾任淡水獸疫血清製造所技士，日本軍馬防疫廠技士擔任新加坡及越南等地軍馬防疫研究工作。現任臺灣糖公司技師及獸醫研究員。

葉耀清：四十二歲，臺灣省屏東縣人，屏東農業學校畢業，民國四十八年度高等考試畜牧科及格，現任國立臺灣大學農學院獸醫系技士。

作者介紹

陳伯松：福建福州市人，四十二年學大畜牧獸醫系畢業，現年三十八歲。曾任職農林廳、臺灣糖公司旗山種豬繁殖場技師。現任臺灣鳳梨公司動物產品經理。

黃清松：臺灣省臺中縣人，三十五歲，臺灣大學畜牧獸醫系畢業，現任臺灣糖公司虎尾總廠繁殖場主辦獸醫師，並從事豬隻人工授精之試驗研究。



陳伯松



張聯欣



黃清松



葉耀清

脫腔容易發生於母猪妊娠後期或分娩後。分娩終了胎衣尚未排出，陣痛未止，腹壓未退時，不但容易發生脫腔，且可誘引子宮脫。此種情形多為腔口或子宮頸及有各韌帶鬆弛缺乏收縮力而發生。輕度的脫腔見於母猪臥伏時，腔反轉在陰唇外部，當母猪站立時，則自動縮隱在陰戶內。此種程度通常對健康還沒有很大的影響。重度的脫腔不分

子宮脫早淘汰

脫子宮是豬的一種預後不良的疾病。因豬與牛馬不同，外脫子宮容積太大，一經全部脫出不易納還，並極易擦傷出血發生水腫和壞死。所以剛開始脫出一部或一側而無損傷時，還原較易，可按脫腔的處理方法加以整復醫治即可。但全部子宮外脫經過稍久後出血很多，水腫很厲害，迅速發生壞死，則處理困難。所以遇有本病應早期處理或即請獸醫治療。全部脫出後即使能把它還原亦會引起繼發病，預後多數不良，對於哺育小豬，及以後繁殖都很不好，應及早淘汰屠殺最為經濟。

子宮脫早淘汰

形比較危險，不但容易擦傷粘膜，且在產後容易繼發子宮脫，所以無論輕重症都應加以治療，以免引起不良後果。

治療：遇有脫腔，先以微溫生理鹽水或百分之三硼酸水洗滌，再以百分之三至五明礬水沖洗收斂外翻的腔部粘膜，然後用手慢慢而小心的納還陰唇內。用較粗的縫線縫合外陰部二至五針，防止再脫，同時注入水質或油質的抗生素類預防繼發腔炎或子宮內膜炎。並設法排除直腸中的積糞，減低飼料份量或改為流汁飼料，以防便秘。如觀察經過情形良好，可以在四、五天後拆線。

預告

農復會和本社合作，從十六卷廿四期起（十二月十六日出版）每兩期出版養豬專欄一次，內容包括養豬的最新消息、養豬技術指導、豬農經驗談、養豬疑難問題解答、和豬價報導與分析等。除由農復會和其他有關機關供給資料外，歡迎各地讀者們多多投稿，並提出意見。豬農經驗談徵選辦法刊登本期第三十頁。