

# 箱信業農



## 菜蔬

### 栽培番茄青椒

注意排水施肥

【問】：(一)山地可否種蕃茄與青椒？  
(二)蕃茄的叉子是否都應去掉，或留一個叉子？

(三)蕃茄的葉子過長可否剪掉一半？  
(四)蕃茄結實時以留幾個為宜？  
(五)蕃茄最注重何種肥料？

(六)蕃茄在雨多時，有無良好方法，預防霉爛？  
(七)蕃茄生長至多高為宜？是否可任其長高？

(八)青椒為甚濕雨水多時會死亡？有方法可預防否？  
(九)青椒最注重何種肥料？

(十)青椒葉太密時，可不去掉一部份？  
(十一)青椒和蕃茄的定植時期何時為宜？  
(十二)新竹尖石鄉新築國校振興會？

【答】：(一)海拔四百—五百公尺山地，在春夏季能種植蕃茄與青椒。

(二)為預防疫病葉微病發生或減少為害，宜採用單幹整枝，留一枝其餘悉數摘除。

(三)蕃茄葉部不可剪除，但葉根際的二三葉可全葉剪除，以利通風，減少病害傳染。

(四)每花叢留三—四個。

(五)蕃茄以氮素及鉀肥為主，其用量相等或鉀肥略高於氮肥為宜。磷肥僅作基肥一次施用。一般每分地施用尿素七十公斤，氯化鉀五十公斤，過磷酸鈣六十公斤，另施清潔

堆肥三千公斤。  
(六)蕃茄果實霉爛，可噴射大生七八可濕性粉劑四百倍液預防。

(七)一般有一—七段果實着果後，將頂端摘除。

(八)青椒根羣軟弱，故忌積水，慶設法排水，使土壤通氣良好，以免根部窒息腐爛。通常作高畦栽培，栽植穴不可低於地面可減少枯死。

(九)青椒肥料與蕃茄略相同，但氮素可稍為提高。

(十)不宜剪除葉部，應調整行株距以防過密阻碍通風。

(十一)以貴地應在三月下旬—四月上旬栽植為宜。(王進生)

## 作旱

### 新竹特一號油菜

適合花蓮區栽培

【問】：(一)油菜自播種至採收須時多久？  
(二)花蓮地區二期稻作收成後，在行中播種(直播)是否能於次年第一期作插植前收成，而不影響插秧時間？

(三)育苗及直播每分地各需種子多少？  
(四)於稻田，其株矩行矩各多少？

(五)花蓮富里鄉石牌村富北二號羅添壽？

【答】：適合花蓮地區的油菜品種，有「新竹特一號」，其生育日數一百三十一天，於二期稻作收成後(十一月月上旬)，行直播，其收穫期須延遲至翌年三月上旬，故稍推遲第一期作插秧。如水稻採用早熟品種，提早於十月中下旬收穫，則尚可趕上插秧，如水稻用一般晚熟品種，油菜必須採用糊仔栽培法，在第二期水稻收穫前廿五至四十天(即國曆九月中下旬)播種於苗床，待苗齡廿—廿五天即移植稻田，油菜最遲翌年二月下旬即可收穫，故不致影響第一期作插秧。

(六)花蓮地區最適播種期是九月中旬至十月上旬，移植期為播種後廿—廿五天，行距五十公分株距廿公分。

聞名世界之植物ホルモン劑 日本原裝

# ナフサク錠


農藥登記證727號

## 農 富 收 片

蔬菜、果樹、要豐收請：

趕快使用「ナフサク錠」

蔬菜、豆類、瓜果類——促進生長，增加收量，提高移植成活率，促進種子發芽。  
柑 桔 等 果 樹——防止落果，促進果實生長及膨大防止落花增進結果。



三共株式会社

台灣總代理

中国化学製業股份有限公司

經銷處

裕隆商行

臺中市建國路一六七號