

十公克。(劉文慶)

〔育苗者每十公畝約需種子五十公克，直播者以點播爲佳，每十公畝需種子一百五

### 樹果

#### 鳳梨株一年以上

#### 才可用電石處理

〔問〕：(一)電石處理的鳳梨植株必須多大，施用電石何時行之？(二)電石處理後幾天才可施肥？通常施肥量爲何？爲提高品質，三要素如何配合？

〔答〕：(一)據說鳳梨肉質有硬與軟之分，是否事實，爲何鳳梨有酸、甜，欲使鳳梨硬而甜時，要如何處理？(二)據義民路三〇號郭茂修

〔答〕：(一)電石處理鳳梨，植株須栽種後經過一年以上，且完全葉在三十五片以上者爲宜。電石處理最好於夜間午夜至黎明之間進行。電石處理後七—十天宜施肥一次，每株施肥量爲硫酸銨四份與硫酸銨一份之比率混合肥料，約二十公克。

鳳梨之品質受品種，成熟之時期，天氣之變化，施肥管理及地勢等之影響，差異頗大。肉質果之果肉較充實，且果汁多而甜，酸味則較少，果汁少而酸度較高。在果實發育期間加以適當之澆水或多施氮肥時，有提高肉質果率之可能。(黃季春)

#### 鳳梨園可間作甜橙

#### 電石處理提早結果

〔問〕：(一)三年生鳳梨園間作澳洲甜橙(已三年多)，近發現桃葉乾枯，是何原故？(鳳梨園內間作甜橙，是否可以？應如何管理？

〔答〕：(一)臺東區鳳梨果施用電石，與冬果施用荷蘭蒙，以何時最佳？互換是否可以？(二)澳洲甜橙葉乾枯，應仔細查

看枝幹如有小孔，可能係咖啡木蠹蛾幼蟲鑽入爲害所致，使用地特靈粉劑一比二〇倍稀釋塗刷枝幹防治。

鳳梨園內間作甜橙，是可以的，惟栽

植鳳梨應距果樹較遠些，且應嚴防病蟲爲害，注意噴藥。

〔應用電石調節產期，可分兩個時期，一是八—十月將早果提早爲春果；一是三—五月將冬果提早爲秋果。兩個時期都可用電石處理，惟用荷蘭蒙(生長素)於八—十月處理，其效果遠不如三—五月處理較爲穩定。(王兆全)

#### 木瓜酵素消路無定

#### 目前尚無專業經營

〔問〕：(一)關於木瓜酵素的採取技術，在目前是否有專書可供參考？若有可向何處購買？

〔答〕：(一)專業經營採取木瓜酵素，前途如何？又如木瓜酵素粗製品是否有外銷？單位價格多少？臺灣目前由何家外銷商代銷？(二)本省目前何處有經營此業者？成績較好者有何處？(宜蘭三星鄉雙寶村中平路三一號李子青)

〔問〕：(一)參考資料可向高雄鳳山鎮鳳山熱帶園藝試驗所園產加工系陳主任景福借閱或索取單行本。

〔木瓜酵素沒有可靠銷路，目前不宜盲目專業經營，因臺灣目前還沒有外銷商代銷，價格不詳，銷路而有問題。

〔省內目前沒有專門經營者，大部分是由於雜誌刊物之報導，初步試製觀察的爲較多，試驗上較有記錄者有鳳山園藝試驗分所等試驗機關。實際經營成功的至今還沒有。(朱仙和)

### 木林

#### 芳樟採葉製油時期

#### 十月至三月最適宜

〔問〕：我有芳樟七年生，一甲三分地，但最近二年來採收總油量，利害相差很大，但管理並無差異，特請指示採收適當期間及管理方法。

〔芳樟蟲害嚴重，每年四—十月必須每廿天噴藥一次，否則芽葉全部被蟲吃光，請問除噴藥外，是否有其他良好方法可防治？(南投國姓鄉壯山村一六八號火炎)

模範農友所愛用的優良農藥

# 烏斯普龍

(ウスプルン)

100g. 原裝  
500g.

(登記證第69號)

## 日本特殊農藥株式會社 出品

種子、種薯消毒，又可葉面撒布，土壤消毒。

(茄子、煙草、蕃茄、瓜類、辣椒等之立枯病用800倍)

臺灣總代理：永裕行德記 股份有限公司

現貨供應處：進 豐 行

臺中市向上路一段2~5 電話：6227

# COSAN 高山

UBER 150 JARRE



Colloidal Wetttable Sulphur

膠質可濕性硫磺粉劑

主治：

- 紅蜘蛛類
- 果樹類之瘡痂病
- 菸草白粉病
- 蔬菜類之一般病蟲害
- 各種植物之粉黴病

豐華有限公司

臺北市郵政信箱3339號

製造廠：西德 RIEDEL-DE HAËN AG.