

【答】：(一)一般製油時期，以十月起至翌年三月最為適宜，最適當之月份現在研究中，來信所謂：「差得太利害」是否因生葉收量有不同所致，至於管理方法要注意割草外，須行植六鋤草、中耕施肥等集約經營及注意剪枝問題。

(二)祇有繼續噴藥尚無其他好方法。

棕樹種植：五年採皮

【問】：本省產棕以何地最多？

(一)每公頃產量多少？

(二)現在每公頃價格如何？(大甲農校教務處)

【答】：(一)棕在臺灣，目前以嘉義一帶產量較多。

(二)棕皮產量，常以林地之優劣，株數之多少等而不同，頗不一致。大約栽後五、六年即可採割棕皮，繼續五、六年。每公頃約可得一萬公斤到二萬五千公斤。

(三)現在每公頃約六、七元(黃希周)

物作維織

栽培葛藤須有合約

【問】：請問栽培葛藤有何優點？葛藤纖維維管公司地址在何處？我有廿六公頃山地頗合栽培地，理條件，惜無資金，如欲種植葛藤，如何才能找到合作者或借貸資金(本市農會無此貸款)？(宜蘭市中山路十七號林忠良)

【答】：(一)葛藤對栽培土地的選擇並不嚴格，新墾地平地均可種植，葛藤收穫鮮工，以增加工農收入。葛藤為豆科植物，收穫時打落鮮葉可供兔、羊、牛等家畜飼料或綠肥，坡地可供水土保持覆蓋作物。塊根可供藥用。惟需選擇近水源地區集中種植，二、三十公頃始可設加工廠採織，採織需要相當技術，才能獲得合乎標準的纖維，採織需要人工較多，初年種植所需種苗費用較多，每公頃約三千元，第一年鮮葉或纖維收量較少。

(二)臺灣葛藤纖維維管公司的地址為臺北市延平南路十九號(三樓)，中國葛藤生產

中心的地址為嘉義市永和街十一號之七，分別收購本省葛藤產區鮮葉或纖維。本年收購價格除葉之鮮葉每一百公斤僅拾元，乾纖維每公頃陸拾伍元。

(三)貴處如有葛藤種植，欲進行種植，請與當地農會聯絡，將種植地區、面積、農戶姓名及詳細地址等，函告葛藤維管公司，派員勘查，由農會與葛藤公司訂立葛藤生產收購合約，再由農會或轉向土地銀行貸放農友葛藤生產資金。(賴錦立)

畜家

有黑斑病甘諸
牛食後會中毒

【問】：據說牛吃了少許黑斑病的甘諸會中毒，那麼請問青甘諸可否做為泌乳牛的飼料。(楊梅高山里一七號陳南昭)

【答】：腐爛的甘諸，多數含有甘諸黑斑病菌，草食動物吃後多會發生甘諸黑斑病中毒現象，嚴重者會死亡，前日本人在臺灣曾做過試驗。但青甘諸與甘諸塊根發生黑斑病是不相同的，青甘諸甘諸莖是緊壓貯藏，因其有嫌氣菌類如乳酸菌等在促進醱酵，對動物無毒，用為泌乳牛食用甚佳。(黃立琴)

仔豬患白痢病
抗生素可治療

【問】：(一)小豬生後十天就開始下白痢，治療好了，但隔幾天又下痢，屢治屢好，經過很多次，到斷乳後才不下痢。這樣是否跟母豬有關？

(二)市面所售的腸炎肺炎疫苗，預防母豬以後，是否對仔豬能產生免疫？免疫時間多久？(雲林林內鄉林茂村十七號張龍樹)

【答】：(一)據來信所說仔豬是患白痢，發生白痢的原因很複雜，主要對策是豬舍通風良好，豬舍勿使其潮濕，經常保持乾燥，母豬飼料要新鮮且富有營養的，絕勿用酸變飼料。白痢的治療可用抗生素(如氯黴素、金黴素等)或磺胺劑治療(打針吃藥均可)，外加一般消化性胃腸藥均可得到良好效果。痊癒後須繼續治療二天左右，就不會再發生。

小麥的除草

最老牌 最正確 最可靠 最效力宏大 最安心

石原 2,4-Dソーダ塩 除草劑

由日本進口，原裝供應

※麥田除草一甲用藥量 300 公分，使用稀釋水量 600 公斤水 (即 2,000 倍水) 僅少化錢，最省錢省力，濶葉雜草立即枯死

※小麥下種後 25 日至 35 日之間，株高約達四臺寸時使用為適期

農藥登記證 346 號
商標註冊證 15695、15272 號


製造元 石原產業株式會社
總代理 大豐農藥股份有限公司

臺北市永綏路 8 號

現貨供應處 臺灣吉本農化企業社
臺中市柳川西路 152 號

火燒柑 銹病 紅蜘蛛 特效藥！
銹壁蟲 瘡 痂 白粉病
增進着色

可樂農 CORONO



最老牌

膠質可濕性水和硫磺劑

Certificate No 172



總經銷：經華貿易股份有限公司
台北市郵政信箱 1764 號 TEL: 58680.