

產乳劑，五十多DDVP及三十五多安殺素(殺蟲淨)，各用一千倍，且其對蚜蟲也均有防治效力。馬拉松對小產蟻已產生低抗力。但對蚜蟲仍然有防治效力。

四「地特松」對蔬菜之菜蚜、偽菜蚜及挑蚜防治效力均差，而其對小產蟻尚屬良好。任何藥劑在田間使用，其防治效率甚少有一百分之百的。

(四)寄來之番茄二個果實內均有番茄夜蛾幼蟲蛀入為害，且蟲體很大，目前施藥已太遲，應在開花以前徹底防治，才能減少被害。致於噴入果實內的番茄夜蛾幼蟲，雖然有藥劑可防治，但此藥甚毒，現禁用於蔬菜上，而安全藥劑目前尚在試驗中，故只有將被害果以人工採除捕殺為宜。(張良傳)

提高洋菇堆肥酸度 可防止塊菌病發生

【問】：(一)製造洋菇堆肥為什麼要用洋菇專用碳酸鈣？改用普通石灰可以嗎？

(二)洋菇床上的堆肥長出白霉，要怎樣處理？其對洋菇有沒有害處？

(三)堆肥翻堆時沒有用硫酸銅處理，現在已上床可否再噴射？

四微信周刊上曾說：種洋菇必須經常噴射「福爾馬林」，請問怎樣噴射法？又如洋菇生長期中，可以噴射防治塊菌病嗎？(臺中市西屯區廣福里庄尾巷一號廖學森)

【答】：(一)製造洋菇堆肥不可用普通石灰，蓋因普通石灰無法維持PH值之均衡，也就是說施用普通石灰後PH值很高，但經過短時間後即驟然降低，完全失掉它原有的效能，故製造洋菇堆肥，必須施用洋菇專用碳酸鈣為宜。

(二)白黴菌對洋菇影響不大，它在低溫情形下不能生長，如有少部分發生，可將該處堆肥換掉，並保持室內通風良好，多者用一大生M(二二)五百倍稀釋液噴射即可。

(三)硫酸銅通常在翻堆時施用為宜，如已上床，施用硫酸銅，不但效果不好，反而徒增無謂麻煩。

四福爾馬林仍屬水溶性劑，具有強烈的刺激性，其揮發甚快，通常用於設備完全的溫室消毒，故洋菇已上床，施用甚為不便，並且不能收到很好的效果。如要防止塊菌病的發生，提高PH值仍為上策。因塊菌病發生於PH值五、二、一五、五者最多，是故PH值的提高可抑制其發生之可能。如發現少部份可用日本製「克壤土」乳劑五百倍或「必滅速」一千倍局部噴用，但此法施用後塊菌病與洋菇將同時死亡(約經過十天後可再行播種南洋)是故，根本方法只有提高PH值或有收穫可能。(杜自顯)

菜蔬

耐暑花菜鳳山晚生

三月上旬開始採收

【問】：(一)需要在三月上旬開始收穫的花椰菜晚生品種，何種較適合？

(二)花椰菜品種，有無試驗改良繁殖的優良品種？

(三)目前晚生花椰菜中，何品種較耐暑？

四興農種子行出售的興農晚生、赤拔晚生、富農晚生及鳳山晚生等有什麼差別？其特性如何？種子何處繁殖出售？

(四)前數年有晚生花椰菜種子繁殖，現在是否仍有出售？(高雄縣大社鄉觀音村頂巷二號張老象)

【答】：(一)三月上旬開始收穫的晚生花椰菜品種，以鳳山晚生為良種。

(二)目前有鳳山極早生、鳳山早生、鳳山中生、鳳山晚生，均為鳳山試驗所育成的品種，以上品種的種子可向鳳山農友種子行洽購。鹽水鎮之鹽水中生，鹽水晚生兩種純度均相當高，屬於優良品種。

(三)現在晚生花椰菜品種以鳳山晚生較耐暑。

四興農晚生係日本生產的 Early Snow Ball 系統，赤拔晚生及富農晚生均為哥樹系統，鳳山晚生由農友種子行繁殖。

(四)鹽水晚生花椰菜種子現仍有繁殖，並由該鎮農會指導採種。(王進生)

蕉農·欲求秋冬蕉符合外銷標準

增加果手重量，提高品質，提早收成



榮獲·蕉農 200 名歷經三年並合作社，有關農業機關等實驗證明效果優良。

保證·無影響品質，施用有益，每株蕉株施用藥費僅有新臺幣 6 分能增加最後二果手重量。

應秋冬蕉增產需要·現在開始供應
請向各地「集貨場」購買

注意·為避免類似偽劣藥品，魚目混珠之嫌，全部委請青果合作社經由各集貨場統一經銷。
「香蕉旺」二號劑用於蕉株灌注或葉面噴霧，三號劑用於果柄尾端吸收。

歡迎·向青果合作社，集貨場及敝社免費索取說明書及實驗成績表以供參考。

總經銷處·臺灣吉本農化企業社

臺中市柳川西路152號

最新改良優秀新品種出現

最合儲運外銷名品種介紹

長岡交配 早秋甘藍

本種由初秋甘藍再加以改良
特：耐 耐 耐 多 快 美
性：腐 暑 病 收 大 味

改良早生 雲仙五寸人參

本種由新黑田人參再加改良
特：快 多 耐 耐 豐 肉
性：大 收 暑 病 滿 優

成功交配 綠寶甘藍

本種由特殊品種配合再改良
特：耐 耐 耐 快 多 質
性：暑 腐 病 大 收 優

專營各國優良種子·品質純正
價錢公道·價目函索·附郵即寄



嘉義市西門街·郵匯 80002·電話 3479

台灣總代理 進出口部 周瑞和商行

批發零售部 周瑞和種子行