

魚養

養黃鰱水深25公分
夜間投放人工餌料

【問】：(一)我家有空地，擬養黃鰱，請問高市前鎮區工業地域化學工廠的廢氣甚多，是否相宜。
(二)黃鰱種可從何處購得？
(三)其主要飼料有那幾種？
(四)開黃鰱在廿公分以下為雌性，而在卅公分以上為雄性，確否？
(五)市上所售之黃鰱可否做種？據說用電捕捉的乃能生育，確否？
(六)黃鰱在何種環境生長最為適宜。
(七)養鰱上應注意些什麼？(高市中山三路廿一號之廿五益益商)

【答】：(一)信中所言工廠廢氣很多，料係空中散發性之無用廢氣，該種氣體除對陸生生物或動物有些微影響外，對水中生物(包括魚類)並無顯著影響，若貴處地下水含有該種廢氣，則應慎重考慮，以免損失。
(二)目前蘇灣一般養鰱用或蓄養用之黃鰱，多由附近村落收購而來，據所知，高雄一帶所需大小黃鰱，多向臺南縣或高雄之鳳山、旗山及小港一帶從事捕撈的小販處收購。
(三)黃鰱的主要飼料除天然餌料外，人工飼料當以新鮮之什魚或魚粉為主。
(四)此點不確，料係傳聞。
(五)市面所售之食用黃鰱，多係電捕而來，魚體難免受傷，有的亦會死亡，但仍具有生殖能力，購買時，務需詳細檢查。
(六)黃鰱在自然環境中，最喜棲息於稻田之田畔泥土中，並在土中挖穴而居，不如其他魚類之終生在水中生活，在潮濕的泥土中即能生存。
(七)此點範圍甚大，非三言兩語所能說明，現簡述數點：(1)體型務需一致，以防弱肉強食。(2)生鰱小鰱，應即行分池。(3)不需太深的水，一般在廿五公分即够。(4)池底最好堆置部份高出水面之粘土以備棲居。(5)白天不要投放飼料，因其在夜間搜餌。(6)防洪及防止狗貓之侵襲。(7)飼料要新鮮。(8)注意水質惡變，必要時給予調整。(安可倫)

畜家

樹薯養豬
最高用30%

【問】：(一)黑豆餅與黃豆餅作飼料，其營養成份有差別嗎？
(二)樹薯每臺斤一、四元，黃玉米每臺斤二、三元，如養豬以何種比較經濟？(雲林縣水林鄉水林路八九號林昆戶)

【答】：(一)為豆餅之成份尚無分析資料，但從鳥豆的成份看來比黃豆差，鳥豆的粗蛋白質僅廿七、六三(黃豆粗蛋白質為卅八、五五)，故鳥豆餅的粗蛋白質可能在三十%左右，而黃豆餅為四十%。
(二)樹薯與黃玉米均為碳水化合物飼料，但玉米的粗蛋白質較高(二倍多)，惟如樹薯價錢便宜，當可以多用，但不能完全代替玉米，樹薯營養最高可以用全飼料量的卅%左右。又樹薯渣的價錢較樹薯更便宜，故以樹薯渣代替樹薯更為經濟，且效果差不多。(張聯欣)

要牛隻壯大

須注意管理

【問】：(一)如何辨別小牛將來長得大或是長不大？
(二)牛不吃割的青草，且大部份踐踏消耗掉，是何原因？
(三)小黃牛與小水牛毛皮乾燥而瘦弱，會流汗及下痢，是何原因？如何使牠毛皮漂亮而肥大？
(四)小牛內外寄生蟲如何防治？(苗栗頭份鎮上埔里一鄰二號郭順福)

【答】：(一)如何預測小牛會長得大或長不大，這個問題很難回答，因為祖代的遺傳也有關係，不過，一般而言：出生時體格較壯大，將來成長時就有比較大的可能，但不是絕對的。
(二)割來的青草牛不吃，可能所割的為野草，你的牛本來就不愛吃，假如你能割牧草給牛吃，一定會吃而無消耗。
(三)小牛很瘦，皮膚乾燥而無光澤，這是營養不良的現象，可能母乳不足，必須每天

COSAN 高山

UBER 160 JAHRE



Colloidal Wettable Sulphur
膠質可濕性硫磺粉劑

主治：

- 紅蜘蛛類
- 果樹類之瘡痂病
- 菸草西瓜豆類白粉病
- 蔬菜類之一般病蟲害
- 各種植物之粉微病

豐華有限公司

臺北市郵政信箱3339號

製造廠：西德 RIEDEL-DE HAEN AG.

樣品・說明書函索即寄

日本 東海牌

動力噴霧・灌水兩用機

日本政府
JIS檢定合格
幫浦效率最高

附三菱牌單相馬達
壹馬匹及附屬品，使
可調換汽油引擎用。

■重量：17kg

最高壓力：35kg/cm²

常用壓力：21kg/cm²


送水量：噴霧每分29公升

灌水每分53公升

(日本岡恒老牌)


天下一品

赤白ビニール卷




優點：

- ①24小時繼續使用不損機件
- ②抽水可送達200公尺高處，傾斜度90°仍可到達
- ③用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用
- ④本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完



採果鉗・剪定鉗・接木刀



採果鉗・剪定鉗・接木刀



生花鉗

能剪鉛線
近期進口

總經銷新高貿易股份有限公司

臺北市峨眉街68號
電話：34190號