




老同年 劉興飲作



口服避孕藥安全有效 美國食品醫藥局聲明

美國食品醫藥管理局顧問委員於去年十月發表聲明，強調口服避孕藥安全有效。

這項宣佈，使數百萬正在服用口服避孕藥的美國婦女們獲得極大的安心。通常婦女們最常詢問醫生的問題是：「有效嗎？」或是「安全嗎？」美國醫藥學會所屬人類生殖委員會（The Committee on Human Reproduction）於去年六月間提出報告說：「口服避孕藥的效力是百分之百，和結紮或完全禁慾同樣是最確

實有效的方法。」最近管理局的報告雖然比較慎重，但仍然宣佈說：「口服避孕藥的效力是令人意料不到的！」該局的報告指出，根據目前的事實，口服避孕藥能否被採用的問題，已經不復存在。在回答使用口服藥是否安全問題時，該局雖然謹慎小心，但仍然是肯定的。目前還沒有事實證明人類服用口服避孕藥片會有一「不安全」的問題產生。

使用口服藥的人已漸漸在增加，一九六一年四十萬零八千人，到一九六五年總數增至五百萬人。將來仍然是會漸漸增加的，預計到一九七〇年將增至一千萬人，到一九八五年將有一千九百萬人服用口服避孕藥。

食品醫藥管理局局長柯達博士（Dr. James L. Coddard）宣稱，明年將開始做五萬位甚至五十萬位婦女的追蹤研究。柯達博士又謂，將以該局研究的報告結果，做為推薦提高口服避孕藥使用範圍的依據。該局對口服藥的限制使用年數，目前定為一年半到四年，使用期的長短，視藥劑的種類與服用經驗而定。服用口服藥是否會影響到血液凝固機能障礙，因果關係尚未獲得證實。有些服用口服避孕藥的婦女，發生肝機能的轉變及黃疸病，因此曾經患有或現患肝病及機能不良的婦女，不應採取口服避孕的方法。具有敏感性的人，服用口服避孕藥或者任何藥品，往往都會產生不良作用，然而會產生副作用的人必是極少數的。

口服避孕藥所能引起的副作用，通常是噁心、中間終潮、體重增加、乳房痛、經期縮短、經血減少或者排出物的改變。