

【答】：(一)東部玉里一帶適宜種植晚霜西亞(甜橙類)，但夏橙係雜柑類，在本省目前僅品種觀察無經濟上栽培。其是否適合本省風土，未經試驗無法奉告。

(二)晚霜西亞係晚熟種，成熟期在三、四月間，該時期柑樹均已採收，生產時期不衝突。故售價高。目前本省僅臺東一帶有大規模集中栽培，因易罹潰瘍病，故園地須選避風地點，因此目前栽培不多，諒無過剩之虞。

(三)晚霜西亞苗木可向臺東區農業改良場洽購。(敬夢如)

柑桔氣肥過多

影響開花結果

【問】：我在鶯歌鎮中湖里山坡地，栽種柑桔與桶柑，共有三千多株，現已滿六年以上，並設有階段，現在果樹發育良好，但尚未開花結果。未知是否氣候關係或欠之何種肥料。現每年均施用尿素三十%，磷酸五十%，氯化鉀二十%混合施用，又開花前噴射馬拉松乳劑。混合磷酸加里，仍然不能開花，煩為指教。(新竹縣新埔鎮新民軍中正路三七四號劉阿潭)

【答】：滿六年的桶柑或桶柑，該達結果年齡，若以徒長枝作接穗繁殖的苗，雖略會遲延結果開始年齡，但不致於發生三千多株均不開花的現象。

通常土壤中氮肥過多時，由於植株生長旺盛，消耗植株內磷化物，易引起不開花結果現象。惟來函所施用之肥料比例，不該發生氮肥過多現象。但土壤內石灰含量過多時，鉀肥之吸收易被阻礙，致引起氮肥特別容易被吸收，可能發生上述氮肥過多之現象。最好先將土壤分析好，再設法挽救。(翁仁毅)

菊水梨適合高山地栽培

【問】：(一)霧社附近海拔一千公尺左右山坡地，栽種板栗，株距十公尺，其間種一株溫州柑或檸檬是否可行？

(二)朱教授介紹之菊水梨是赤梨類或白梨類？其產量與經濟價值如何？是否適合我地種植？

【答】：(一)鴨梨在本省之栽培情形如何？有無經濟價值？

倘有人說巴德雷梨有青皮與黃皮兩種，兩者比較何者品質較優？

(二)請介紹適合一千公尺高度種植，並具有經濟價值的梨種？(南投埔里木部溪中山路一六號康昭)

【答】：(一)株間可種溫州柑，不宜種植檸檬。

(二)菊水梨皮色黃綠，肉白、豐產，臺灣山地須種在一千七百公尺以上地區，海拔一千公尺處不宜種植。

(三)鴨梨向在試栽中。

倘巴梨只有一種屬黃綠色者，另有一種赤色種正在試栽中，青皮種乃係新交種，品質差。

(四)一千公尺現尚無適合之優良梨種，如要種，應種橫山梨產量較佳。(朱長志)

電石催熟香蕉

需再冷凍黃熟

【問】：關於香蕉催熟，請問：將香蕉放在缸內用電石悶蓋三天，取出後皮仍青色，但蕉指全由梗部斷落，是何原因？要如何催熟才能像街上賣的香蕉，黃亮且果梗堅固不脫落？(北投七虎新村臨一號魏炳文)

【答】：香蕉採下後如用電石燻，一日後即可取出。時間長會發生落指腐爛等現象。欲使皮色轉為黃色，須再放入攝氏二十度之冷凍庫中貯藏，經二、三日後取出即可。(王兆榮)

林竹

桂竹加工外銷有技術

竹產品外銷達百萬美元

【問】：本省桂竹加工外銷年有增加，茲有數項有關問題請教，以瞭解桂竹加工外銷之知識。


(一)本省桂竹生產地區在何處？

(二)桂竹加工使用之材料與技術如何？

風行全世界！最新發育，育肥，促進劑！
貧血預防，育肥迅速增加體重劑

フェニトラン 肥豚樂針

(農畜字1012號)



說明書索

- ①防止貧血引起的發育不良症。
- ②迅速增加體重30~50%
- ③防止哺乳期間之下痢與肺炎。
- ④改進體質而增加抵抗力。
- ⑤出生四日前後的小豬一隻一管(1cc)

製造元 日本 岩城製藥株式會社
提携 美國 ヘンリーアンドカンパニー
臺灣總經銷處 博濟貿易有限公司

臺北市武昌街2段91巷1號 電話36148

免費贈送「付二元郵票」博濟禽畜藥品手冊第2版「內容豐富100頁各種疫病與各種新藥品之介紹」每人限一冊及康福利手冊最新新聞各一份。

最新改良優秀新品種出現
最合儲運外銷名品種介紹

長岡早秋甘藍

本種由初秋甘藍再加以改良
特：耐耐耐多快美
性：腐暑病收大味

改良早生雲仙五寸人參

本種由新黑田人參再加以改良
特：快多耐耐豐肉
性：大收暑病滿優

成功交配綠寶甘藍

本種由特殊品種配合再改良
特：耐耐耐快多質
性：暑腐病大收優

專營各國優良種子。品質純正
價錢公道。價目函索。附郵即寄



嘉義市西門街·郵匯80002·電話3479

台灣總代理 進出口部 周瑞和商行
批發零售部 周瑞和種子行