

留意預防常見疾病

防治疾病，預防重於治療，而預防之道，在於日常飼養管理之加強。羊的主要疾病有如下幾種：

(1) 胃腸卡他

症狀：

①胃卡他：食慾、反芻減退或停止，噯氣多，也有攝食異物的現象。

②腸卡他：以無元氣、下痢為主徵。病初便秘，但後變為下痢。糞有惡臭，泥狀或水樣，混有粘液、未消化的飼料和血液等。體溫稍上升，腸蠕動亢進，腹痛和無腹痛均有。

③普通單獨發生胃卡他的很少。

原因：

①飼養管理的失常，特別是飼料的質和給與方法的不良，及冬季給與過冷之水等為主要原因。

②刺激性物質藥劑之給與，因食滯而來的胃內容物變敗，高熱性病的續發等。

療法：

①減食或絕食，改餵容易消化的高營養飼料，或行腹部溫浴。

②病初以芒硝五十公克，水三百西西，使內服

及流腸，排除腸內內容物。

③健胃劑：龍膽末五公克，人工鹽五公克，氧化鎂一公克，混合給與，一日三次。且常用稀鹽酸五西西，苦味酞十西西，水二百西西，混合，一日三次分服。

④止瀉劑：次硝酸蒼鉛三公克一日三次分服。

(2) 第一胃食滯

症狀：

①採食後短時間內茫然佇立。

②呼出惡臭噯氣，流涎，軋齒。

③第一胃的運動完全停止，發生鼓腸。

④呼吸淺而快，呈不安狀態，反復起臥。

⑤輕症時數小時即回復，但重症即死亡。

原因：

①盜食濃厚飼料或粗飼料和濃厚飼料的急變。

②舍飼運動不足或因分娩等體力消耗而引發。

療法：

①輕症時行第一胃按摩和牽出運動即可回復。

②重症以芒硝一百公克，水六百西西投與，然後以微溫肥皂水灌腸，並以健胃劑苦味酞十西西，稀鹽酸五西西，水二百西西混合，一日三次服用。

(3) 鼓脹症

症狀：

①腹部，尤以左側腰部顯著膨滿為特徵。

②四肢張開佇立，呼吸困難，服結膜呈暗赤紫色。

③初期及輕症時有噯氣和第一胃運動。重症即停止。

④重症時，在數小時內窒息死亡。

原因：

①採食受雨和露水打濕的豆科牧草，在胃裏發酵產生大量氣體，噯氣未

羊是最美麗的動物

山羊體態優美，身軀玲瓏，在各種家畜中，可算是最美麗的一種。試看我國文字的「美」，就是以「羊」和「大」兩字組成的。

山羊性喜羣居，古人造字也已採用。即「羣」是由「羊」和「君」兩字組成的。

又在外國，關於山羊的童話神話很多，猶太人甚至以「公羊」作為稱呼皇族或長官的代名詞，可知古代各民族都很愛好山羊。(美)

及排除而發生。

②第一胃運動減弱為其誘因。

③流行性感胃時反芻減弱或停止，第一胃內的食物醱酵，瓦斯在胃內蓄積而發病。也因食道梗塞，噯氣和反芻無法上升，瓦斯充滿胃內而發生。

④採食後反芻開始前運動，反芻受阻而發病。

療法：

①早期發見，排除胃內瓦斯為最重要。

②抑壓瓦斯醱酵。以植物性油(大豆油、花生油、亞麻仁油)五十至一百西西，約加十倍水投與，有著效。

③牛乳、山羊乳一百五十西西，加八至十西西松節油內服，亦有良好效果。

(4) 肺炎

症狀：

①初期發生劇烈痙攣，但通常不容易察覺和發現。

②有鼻漏的呼吸困難，發熱至攝氏四十一度前後，同時可認疼痛性的發咳。

③鼻汁病初濃厚，後稀薄變為水樣赤色。

④初期便秘，後變為下痢。

⑤重症者茫然起立，但變為不能站立。

⑥有的以敗血症在二至六日內死亡，但多以慢性經三至六週死亡。普通肺炎的死亡率為一〇—一二〇%，誤嚥性肺炎的死亡率較高。

(未完)

作者介紹

▼黃立羣：江西宜豐縣人，民國三十六年任臺灣省農業試驗所畜產系技士，至民國四十七年臺灣省畜產試驗所成立後即轉入該所任技正，負責大動物飼養管理，擔任所組織法正式公布後，擔任養牛系主任，負責牛的飼養管理，並主持乳用牛品種改良工作。



黃立羣



李進益

：臺灣省屏東