



成份正確

保證效能

正豐農藥

介紹最新陸稻水稻除草劑……

思登卅四 乳劑 登記證 277

水稻除草劑……

多 谷 粒 劑 登記證 665

■說明書函索即寄

各種作物病蟲害特效藥！

水稻：螟蟲

正 豐 松 乳 劑 登記證 506

美 粒 松 乳 劑 登記證 225

寶 利 多 乳 劑 登記證 310

柑桔：紅蜘蛛

殺 蟬 靈 乳 劑 登記證 875

利 果 靈 乳 劑 登記證 904

利 果 松 乳 劑 登記證 816

蔬菜類：青蟲・吊絲蟲

特 殺 松 乳 劑 登記證 350

富 特 靈 乳 劑 登記證 325

全 滅 靈 乳 劑 登記證 876

菸草：夜盜蟲・青蟲・蚜蟲

能 敵 師 乳 劑 登記證 407

可 樂 收 乳 劑 登記證 307

水稻：葉稻熱病

抗 病 水和劑 登記證 361

小麥：銹病

財安泰可濕性粉劑 登記證 707

正豐化學股份有限公司

臺中縣霧峯 電話：霧峯六三號

既病應該撲殺

經過診斷結果，有本病疑陽性和陽性反應的牛隻，都須隔離觀察，如陽性牛隻的反應高度或隔離中反復檢查反應逐漸昇高的，或由牛乳和其他材料證明病原菌，或由畜主申請而予以撲殺的，政府酌給補償金。此項工作由民國五十二年自南部各縣市逕向北部實施，且自五十二年李組長由紐、澳二國考察歸來的建議，更由五十四年起實施四至八個月的牝犏牛的十九系苗苗接種，去（五十五）年檢查結果，春期有二十農場共有五十四頭患牛受撲殺，至秋期減至十一農場計十七頭受撲殺，本病的威脅已有漸漸減少的趨勢。

定單位的診斷液，在四十倍血清稀釋有百分之五十的凝集度，和補體結合反應血清質量○・○・一二五西呈百分之五十以上不溶血為陽性，並依各種凝集度和溶血程度分別判定為疑陽性和陰性。

乳牛布氏桿菌病在日本，經檢驗後陽性牛隻都要撲殺，雖對牛不作預防注射，但成績很好。在美國，實施檢驗、撲殺預防接種。另訂有徹底清場、清區和清那制度後，成績也大有進步。在歐洲，如瑞典在防治初期，實施檢驗與撲殺及預防接種到發生減少後停止預防接種，並加嚴檢驗標準，清除反應牛、現已消滅。在澳洲，因地區廣闊，據說乳牛都大羣放牧，所以預防接種免疫以犏牛為主。

為防止國外進口牛隻帶病，購牛應選自無病牛羣並經過檢驗，到臺以後再在本省港口家畜檢疫所予以隔離，實施上述檢查無病後才能引進。本病是慢性傳染病，且人和其他動物，如黃牛、水牛、羊、豬等在本省常見與乳牛同舍的家畜，很可能成為保菌者，所以此後應注意徹底隔離反應牛，繼續檢驗，當發現有新患牛即應及早撲殺，並預防接種牝犏牛。因此要求全省酪農與牧場與政府合作，共同努力，此項足以障礙乳牛事業的疾病。

民國三十六年時，本省乳牛平均每頭每年產乳量（三〇五天）為七百五十二公斤。但至五十三時，為三千三百五十五公斤，增加四倍以上。世界各國乳牛平均每頭每年產乳量，以荷蘭最高，為四千二百二十公斤。世界各國乳牛頭數與人口的比例，紐西蘭為一比一・二，美國為一比二・三・八，日本為一比一・五・六，本省為一比二・七八三。（美）

國際組織對布氏桿菌病防治的活動，在巴里的國際防疫會早在一九三六年和一九四八年就診斷標準有所檢討和建議各國採用。至聯合國糧農組織和衛生組織已共同組成布氏桿菌病專家委員會，自一九五〇年以來，每二、三年由世界各國專家集會一次，檢討診斷方法的統一和推動防治工作等，由該委員會輔助。現在世界各地設有十五處布氏桿菌病中心，除中心試驗室外，集合當地區人、獸醫專家調查和指導各地區的本病防治工作。