

蛋白質·要多給

養純西洋種豬最容易導致失敗的原因，是飼料給的不妥當，或因為沒有按照時期多加變化。過去二年曾經起了一陣養藍瑞斯的風氣，開始時因為買價高，多把牠當做寶貝，儘量給飼料，結果因為長的太肥，以致配不上種。到這風氣過了之後，豬價跌了，興趣也低落了，於是馬馬虎虎養，營養不夠，流產、死胎、生出後養不成的情形也就發生了，最後只怪純西洋種不好養！

大體上來說，純西洋種豬和一代雜種豬的養法差不多，只是因為純西洋種豬生長快，飼料利用效率好，因而極易養肥，可是牠却不像本地豬那麼耐粗食，飼料中比較需要含高蛋白質量，在發情前後更需多給蛋白質使其發情明顯，也就是過去在「養豬致富記」內所介紹的母豬要採分期養法，純種豬更應如此。為了讓農友們更確切地知道母豬合理的養法，再詳細介紹如下：

(1) 處女前期：這是在離乳後至生後三、四月齡。在這段時期，豬正在長架子，長肌肉，不容易長肥，因此飼料內必須多含蛋白質，最好是用七成的半混合飼料和三成的甘藷餵。飼量可以多一些，任食也無妨。這段期間內，還要注意礦物質和維他命供給；青飼料要儘量供應，經常自山上採些乾淨的紅土放在豬舍內任豬採食，這樣可以彌補微量礦物質的不足。


(2) 處女後期：這是自生後第五個月至第十個月，也就是第一次配種前的一段時期。在這段期間內，母

豬容易養肥，因此在美國，多把牠放在牧草地上，讓牠儘量採食牧草，每日甚至只供應一次濃厚飼料（假如是在優良的苜蓿牧地上）。在本省，因為都是小規模飼養，關在豬舍內，每日可早晚只餵二頓，飼料只要吃六、七成飽，另給大量青飼料（甘藷、田岸仔草、牧草等）。在生後第八個月，母豬可能就開始發情了，因為初次發情，肚子裏排卵數少，配上去常只會生下三、四頭小豬，因此必須等到生後第十一個月，也就是發情四、五次後才進行第一次配種。在決定配種的那一次以前，就須注意特別養法了。

(3) 配種前後：在美國一般配種時，母豬的體重是一百公斤。為了要讓母豬排卵數多而且發情期準確，在配種前十日就要多餵些飼料，尤其是在飼料內多添些魚粉或煮些新鮮魚頭魚肚等餵母豬，這樣自會容易配上，產仔多。在配種後還要繼續這樣餵，因為可以使受精卵好好地固着在宮壁上，所謂初期保胎。

配種期·要適當

至於配種時間，常依豬隻個體而不同。有的母豬發情期長達四天，有的只有二天。總之，平時就該注意這頭母豬發情期多長，而最適宜配種時是在前三分之二期的後段。例如發情期有三天，那麼在第二天下午配種最為適宜；這個時候母豬體內正在排卵。處女母豬發情期常較短，只有一、二天，假如是二天，就要在第二天上



農藥字第0231號

好速

大必隆乳劑

ORTHO DIBROM* 8E

低毒性蔬菜害蟲用藥

功效特點

- 殺蟲範圍廣泛藥效迅速
- 適用雨季及多雨之地區
- 殘毒期短宜收穫前數日應用
- 對人畜毒性較低安心使用

台灣省植物保護會推廣

有效害蟲



斜紋夜盜蟲 · 小菜蛾
擬尺蠖 · 菜心蝶
大菜螟 · 蚜蟲類
薊馬 · 蕃茄夜蛾



製造廠：CHEVRON CHEMICAL COMPANY
ORTHO DIVISION U.S.A.

總代理：惠農股份有限公司

台北市長安東路2段16號 電話：52093

經銷：惠光貿易有限公司

台南市東門路140號 電話：4971

* 註冊商標