

魚養

晒魚池對養魚有利 施化肥在晴天上午

【問】：(一)整理魚池後將池底晒乾應晒至何種程度？需要施用石灰，每公頃多少量？施石灰後需覆蓋？或施放於池底即可？
(二)施石灰後，何時灌水？何時放魚？
(三)要殺滅寄生蟲及病菌，以三公頃魚池水深保持四公尺左右時，要施放漂白粉多少量？如何施放？
如要施放化學肥料時，過磷酸鈣需要多少量如何施放？

【答】：(一)一般魚池施石灰有二種作用：一為殺除害蟲及有害菌。二為調節PH的高低。假若你的魚池並沒有上述弊端，可不需要施放石灰，如果須要殺滅的話，以三公頃面積用大包石灰約四十五包就夠了。投放方法是當池魚捕完後，不均撒布池底，然後池底土層腐爛至龜裂為佳，因池底經充分日晒後，可增加其多養分，對養魚非常有利。
(二)清池撒布石灰，然後經日晒數日即可注水入池，池水注滿約經一天，就可以放養魚苗。
(三)信中未說明到底是殺滅何種寄生蟲或病菌，所以施放漂白粉的份量也無法奉告，而且以三公頃的廣大水面，若使用漂白粉殺除，在經濟上是很不合理的，而效果也值得研究。現以殺除針蟲(箭蟲)為例，用三十五萬分之一濃度的，在二小時左右幼蟲即可死亡，殺除一般有害菌體，以一百萬分之一的濃度亦可奏效，以上這二種濃度對魚類並無影響。

在日前來說，化學肥料確是一種很好的肥料，但是池塘中必須要有氮與磷與鉀相配合才能發生較大的效果。你的池塘如只投放過磷酸鈣似就可以，最好配合一些水肥(因水肥中含有大量氮磷)，投放的數量不能

過多，因數量太多並得不到預期效果。投放過磷酸鈣的數量三公頃面積須八百四十公升，每月投放數量比率為三月六%，四月十二%，五至八月各月十五%，九月十二%，十月十%。撒布水面就可，但應在晴天的上午施放較佳。

【問】：(一)整理魚池後將池底晒乾應晒至何種程度？需要施用石灰，每公頃多少量？施石灰後需覆蓋？或施放於池底即可？
(二)施石灰後，何時灌水？何時放魚？
(三)要殺滅寄生蟲及病菌，以三公頃魚池水深保持四公尺左右時，要施放漂白粉多少量？如何施放？
如要施放化學肥料時，過磷酸鈣需要多少量如何施放？

畜家

如何飼養乳羊？

【問】：(一)撒能種羊舍，應如何建築？
(二)撒能羊飼養管理要點如何？
(三)撒能羊適於放飼或舍飼？如果舍飼精料和粗料比例如何？
飼一天中何時擠奶較適宜？
母羊配種應在何時？(苗栗造橋鄉大西村廿號張輝惠)

【答】：(一)羊舍每頭佔面積約三尺見方，用木造磚造均可，但要注意通風，排水良好，光線充足，惟經濟條件乃須考慮，最簡單者可用竹片編造，其地面須用木板加高，因羊性喜歡棲于高燥之處。
(二)乳羊放牧，舍飼都可以，但大風雨的天氣要停止放牧，至於粗料與精料之供應，並無嚴格之比例，因為反芻動物之營養，仍以乾物量及總營養分來計算，並且粗料及精料的種類及營養分各有不同，就以豆科牧草與野草而論，營養分相差很大，如甜食豆科牧草，則精料可減少飼餵，如用野草，因營養分少，必須補充多一點良質精料。
(三)撒能乳羊的飼養管理要點，無法詳述，主要者有：
(1)種用羊：生產前要有適當運動，放牧者不必過到運動、妊娠母羊，不可過分肥胖，但要保持適當肥度，精料要注意良好品質，體重在二百四十至二百七十五磅以內，每

最新改良優秀新品種出現
最合儲運外銷名品種介紹

長岡交配 早秋甘藍

本種由初秋甘藍再加以改良
特：耐耐耐多快美
性：腐暑病收大味

改良早生 雲仙五寸人參

本種由新黑田人參再加以改良
特：快多耐耐豐肉
性：大收暑病滿優

成功交配 綠寶甘藍

本種由特殊品種配合再改良
特：耐耐耐快多質
性：暑腐病大收優

專營各國優良種子，品質純正
價錢公道，價目函索，附郵即寄



嘉義市西門街·郵匯 80002·電話 3479
台灣總代理 進出口部 周瑞和商行
批發零售部 周瑞和種子行



六畜興旺
增產報國

富士力必大 リピタ

最新綜合飼料強化劑

- 健胃固腸，幫助消化，增進食慾。(能助健康加速生長)
- 促進發育，可增加鷄鴨產蛋質量。(生長迅速增加產蛋率)
- 能預防廣範圍之疾病及治療之效果(提高抵抗力減低死亡率)
- 強壯骨骼，提高產蛋率及孵化率。

中日合作

力必大工業股份有限公司
高雄市鼓山一路登山巷四號
Tel 56579 · 53895

