

寶作連 根開素

(葉面噴灑後十五日內不怕霜)

春寒季節水稻黃萎病及 霜害防治法

第一期水稻自播種起，即常見黃黃萎萎等情形，一遇霜寒即凍死，未凍死者亦不易長大(其他植物亦然)，一般農友均誤認為稻熱病而噴灑水銀劑或西樂生石灰，不但不能治癒，反而致死。拔起來看其根部即變成黑而爛，這是土壤中缺乏之錳素與硼素，致使發根不良與葉面呼吸困難所引起之萎縮病。

這種情形時，請用「連作寶開根素」即可治癒

用法如下：大噴霧器一桶水十五公斤，開根素八公克(瓦)，尿素二兩，三日噴灑一次，三次即可恢復，如同時摻水銀劑噴灑，效果更顯著(水銀劑之用量是普通防治稻熱病之半量為宜，否則形成水銀置換現象，使錳素脫離，其病狀更加厲害)

其他各種農作物之萎縮病與霜害亦可用同法防治，平常五~十日葉面噴灑一次，對於增收貢獻更大，殊對結實植物增收效果最大。(45公克裝批價15元)

天力化學工業股份有限公司
臺北縣中和鄉景平路47之2號
電話：923111 郵政劃撥5179號

使用農藥時摻本品可防治各種農藥無法防治之不知名病症，並且可加速恢復病弱現象，平常向葉面或根部噴灑均有強烈之開根作用。

萬病之源在根弱

增收關鍵在開根

天飼量不可超過十分之五至十分之七磅。母羊將分娩時，須與羊羣隔離，餵以適口粗料，精料宜減少。

(2)幼羊：乳羊多以間接飼養，最初數日宜以母羊之初乳餵食，大體一日最為體重之五分之一至八分之一，一日分多次飼餵。生後約二個月即可斷乳，可給與精料讓其自由採食，但要充分供應蛋白質飼料。

(3)去角：在必要時行之，用荷性鎊塗擦生長角之基點。

(4)擠乳：一天二—三次，每次相隔時間要均勻，何時為宜，可自己訂定。

(5)配種：生後六至八個月之山羊(包括乳羊)均可配種，但發育不良的羊，則要延長時間至八個月以上。(黃立群)

初產母豬注兔化疫苗

容易引起死胎或畸形

【問】：費刊十六卷二十三期有母豬懷

必詢次(張勝欣)

孕早期接受兔化疫苗後，容易發生死胎畸形或木乃伊化胎兒一節，有疑問請教。我有種母豬二頭，即於配種後注射此種疫苗，一頭係配種後五十日(已配種)注射，另一頭係配種一週後(不知配否)注射。不知此二豬將來發生死胎的可能程度如何？有無補救辦法？若以後死胎其母豬應否淘汰？(新店七張路三六號高上佑)

【答】：母豬懷孕初期注射兔化疫苗，可能容易發生死胎畸形等事實，但並不是每一胎都會發生，發生率不太高。如果是新母豬，以前沒有注射過兔化疫苗的發生率較高，如果新母豬在小豬時候，或經產母豬，會接受兔化疫苗注射者，發生率就極少。來信所說二頭母豬，均無說明經產記錄及疫苗注射記錄，會不會發生無法斷定。此種情形現在尚無補救辦法(除非注射時同時注射血清)。死胎後之母豬可以再配種，不必淘汰(張勝欣)

其他

小農住宅貸款
當地公所申請

【問】：報載省府撥款一億元貸給小農改建住宅之事，請問申請手續辦法如何？(大肚鄉龍山村福山巷六號林榮)

【答】：糧食局辦理小農住宅貸款辦法經明令公佈(刊登省府五十五年冬字第七十五期公報)，依照該辦法第十八條規定，農戶申請貸款應填具改建小農住宅貸款申請書及建地地形圖連同地籍圖圖本各三份，並依照建地情形附送土地使用證明文件，送當地鄉鎮市公所辦理申請，前項有關申請書表格，均由糧食局印發各鄉鎮市公所免費供給，故如有意改建住宅而適合該辦法規定，又是縣政府確有指定改建之地區者，自可逕向各地鄉鎮市公所洽辦申請手續。(糧食局)

讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人的姓名住址。

豐年讀者服務部 謹啓

* 新到貨 *

蘆筍種子
初秋甘藍
濱綠包心白菜

美國 BURPEL 公司原封罐裝
美國 DERRIN 公司原封罐裝
美國華盛頓五〇〇九號廣子
美國加州五〇〇號廣子
日本夕夕種苗株式會社
日本岡交配種苗株式會社
日本夕夕種苗株式會社
●坂田交配種苗包心白菜
●坂田交配種苗包心白菜
總銷處 榮華種子行
三重市重新路二段三之一號
電話：九七二七四九號
郵政劃撥儲金：三五七一號
和美鎮中山街64號電話29號