

連作寶根素

(葉面噴灑後十五日內不怕霜)

春寒季節水稻黃萎病及 霜害防治法

第一期水稻自播種起，即常見黃黃萎病等情形，一遇霜寒即凍死，未凍死者亦不易長大（其他植物亦然），一般農友均誤認為稻熱病而噴灑水銀劑或西藥生石灰，不但不能治癒，反而致死。拔起來看其根部即變成黑而爛，這是土壤中缺乏錳素與硼素，致使發根不良與葉面呼吸困難所引起之萎縮病。

這種情形時，請用「連作寶根素」即可治癒

用法如下：大噴霧器一桶水十五公斤，開根素八公克（瓦），尿素二兩，三日噴灑一次，三次即可恢復，如同時摻水銀劑噴灑，效果更顯著（水銀劑之用量是普通防治稻熱病之半量為宜，否則形成水銀置換現象，使錳素脫離，其病狀更加厲害）。

其他各種農作物之萎縮病與霜害亦可用同法防治，平常五~十日葉面噴灑一次，對於增收貢獻更大，殊對結實植物增收效果最大。（45公克裝批價15元）

天力化學工業股份有限公司
臺北縣中和鄉景平路47之2號
電話：923111 郵政劃撥5179號

使用農藥時摻本品可防治各種農藥無法防治之不知名病症，並且可加速恢復病弱現象，平常向葉面或根部噴灑均有強烈之開根作用。

天飼量不可超過十分之五至十分之七磅。母羊將分娩時，須與羊羣隔離，餵以適口粗料，精料宜減少。

(2)幼羊：乳羊多以間接飼養，最初數日宜以母羊之初乳餵食，大體一日最為體重之五分之一至八分之一，一日分多次餵食。生後約二個月即可斷乳，可給與精料讓其自由採食，但要充分供應蛋白質飼料。

(3)去角：在必要時行之，用苛性鈉塗擦生長角之基點。

(4)擠乳：一天二~三次，每次相隔時間要均勻，何時為宜，可自己訂定。

(5)配種：生後六~八個月之山羊（包括乳羊）均可配種，但發育不良的羊，則要延長時間至八個月以上。（黃立群）

孕早期接受兔化豬瘟疫苗免疫，容易發生胎畸形或木乃伊化胎兒一節，有疑問請教。

我有種母豬二頭，即於配種後注射此種疫苗，一頭係配種後五十日（已配）注射，另無補救辦法？若以後死胎其母猪應否淘汰？

（新店七張路三六號高上佑）

【答】：母豬懷孕初期注射兔化疫苗，可能容易發生死胎畸形等是事實，但並不是

每一胎都會發生，發生率不太高。如果是新母豬，以前沒有注射過兔化疫苗的發生率較高，如果新母豬在小時候，或經產母豬，會接受兔化疫苗注射者，發生率就極少。

初產母豬注兔化疫苗
容易引起死胎或畸形

及疫苗注射記錄，會不會發生無法斷定。此種情形現在尚無補救辦法（除非注射時同時注射血清）。死胎後之母豬可以再配種，不必淘汰（張曉欣）

他其

當地公所申請
當地公所申請
如何？（大肚鄉福山村福山巷六號林榮二）

【答】：糧食局辦理小農住宅貸款辦法

經明令公佈（刊登省府五十五年冬字第十五期公報），依照該辦法第十八條規定，農戶申請貸款應填具改建小農住宅貸款申請書

及建地地形圖連同地籍圖冊本各三份，並依

照建地情形附送土地使用證明文件，送當地

鄉鎮市公所辦理申請，前項有關申請書表格

均由糧食局印發各鄉鎮市公所免費供給，

故如有意改建住宅而適合該辦法規定，又是

縣政府確有指定改建之地區者，自可逕向各

鄉鎮市公所洽辦申請手續。（糧食局）

讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人的姓名住址。

謹啓

病之源在根弱

○○○美國BURPEE公司原封罐裝
○○○美國DESSERT公司原封罐裝
○○○美國華盛頓五〇〇〇九號蘆筍子
○○○日本夕キイ種苗株式會社
○○○日本サカイ種苗株式會社
○○○長崎交配初秋甘藍
○○○坂田交配綠色包心白菜
○○○臺灣總經銷處
三重市重新路二段三之一號
郵政劃撥金三五七一號
和美鎮中山街64號電話29號