

○「來克命」○五公升
花生仁 九公升
花生油 ○七六公升


(乙)調配方法：

①先將含有○五公升「來克命」稱一份，再將炒熟去皮的花生仁十九份。

②另再準備木桶或鉛桶一只，製膠布四尺見方一張及紗布網一張。

③將炒熟去皮的花生仁倒入桶中，傾注花生油（熟油較好），混合均勻。

④再將製膠布平鋪於桌面或地面，並將「來克命」裝於紗布網內。



猪·農·經·驗·簡·錄

▼雲林

縣北港鎮蔡政會農友：

他建猪舍，水泥地上打粗面，這樣地面不會光滑，猪隻不會滑倒，對於懷孕母猪尤為適宜。

▼臺中市國光路徐江河農友：

徐農友在猪舍的牆角放一扇形鐵條架，讓初生仔猪能跑入這牆角的三角地帶，母猪也就不容易壓死小豬了。徐農友還在仔猪生出後不久即把犬牙用鉗子切掉，母猪就不會因仔猪咬乳頭而拒絕授乳。

▼雲林縣古坑鄉蔡永祥農友：

他認為豆腐渣富有蛋白質，是銀猪的好飼料，但夏季天氣熱容易變酸，會影響猪隻健康，因此必須當日買進當天用，這是對的。

至於蔡農友主張維他命、抗生素（如生維質、歐羅肥等）等添加劑必須適量才可增加效力，這就錯了。如你已這樣做，請趕快

個最好的辦法。

▲臺中縣潭子鄉羅海清農友：

他認為甘藷莖須煮沸，這不可不。甘藷莖最好的使用法是切短後直接餵猪，過煮後不少維他命

反而被破壞，只有壞處沒有好處。

▲臺中市西區順泰岳農友：

他在仔猪生下後用一支一百燭光的電燈，上上鋁燈蓋，這樣替仔猪保暖，結果仔猪健康比以前好，白痢也少發生了。

▲苗栗縣竹南鎮蔡有仁農友：

蔡農友以前養猪，常發現猪隻在猪舍內亂咬牆壁、木板、飼槽，後來在猪舍後開了個運動場，讓猪在運動場中吃些乾淨的泥土，這樣壞習慣就沒有。這是因為猪隻缺少微量礦物質，而這些東西在泥土中就可供應。（農友們！天點乾淨的泥土在猪舍內，假如猪隻搶着吃，就是表示缺乏某些礦物質了。）

▲南投縣水裡鄉林森傑農友：

他發現不道德的猪販常用不法手段欺騙農民，用特製的秤子偷重或欠款不還，因此賣猪時要特別小心，參加農會共同運銷是一個最好的辦法。

稻作共同防治

推廣卓著

據調查，去年第一期作全省總平均，每公頃產量無施藥對照區為三、三五四、四二公升，一般防治區為三、九一八、三六公升，而共同防治區為四、四三七、六七公升。如以每公頃防治病蟲害結果的淨收益來比較，無施藥對照區為一〇、七八〇、九四元，一般防治區為一〇、〇二〇、九〇元，而共同防治區為一三、三四六、九八元。

至於第二期作，每公頃產量無施藥對照區為一、六七三、三三公升，一般防治區為三、八七三、三三公升，共同防治區為四、三二八、八公升。如再以每公頃防治病蟲害結果的淨收益來比較，無施藥對照區為五、二七七元，一般防治區為一〇、八九二元，共同防治區為一二、二八六元。（美）

地點，並預作記號，以便放置盛餌器。預備盛餌器和大湯匙。湯匙用來提盛毒餌，傾於盛毒餌器內。放置毒餌地點，可視松風種類和林木種類、生長情形而定。最好在松風常出入的路徑，平掛於枝梗上（如圖二）。一般松風性喜在林木邊緣雜木蔭蔽地帶，以小溪流兩邊較為活躍。

放餌的時期：①山上松風食料最少的時期，②山上農作物栽培面積較少的時期，如農作物收穫之後。③乾燥季節。一般而言，本省中南部以十一月至翌年二月乾旱期比較適宜。

通常每一公頃放置二十個盛餌器，每盛餌器第一次置入四兩為度。在第一星期內，每隔一、二天應至林間巡視一次。以後每隔三、四天調查一次，並加添毒餌。

如於調查時發現毒餌消耗量較多或鼠隻活動較繁的區域，盛餌器內毒餌放置量應予增加。

林間放置毒餌三、四天後，就可發現中毒爬行遲緩的鼠隻或屍體，應予掩埋。

毒餌放飼在林間，不可少於四星期。