

老同年

劉興與飲作

(上接第五十一頁)

醫師要有耐心

灌輸衛生教育

這樣說明以後，大多數的婦女都不再要發覺她們取出「樂普」。我除了對真正因「樂普」所發生的副作用外，都設法使她們釋去心中的疑惑，所以我自己取出的例子不多。

但是有一部份醫師對這類要求取出「樂普」的婦女，怕麻煩給她們詳細說明，往往一要求就馬上替她們取出。

我認為應當費一些時間來給予她們衛生教育，使她們對「樂普」所加於生理的影響有較深的瞭解。否則，

她們以為身體上任何病狀，都是因裝置「樂普」而起的。這樣一來，會把自己的錯誤觀念傳播給很多婦女；誤認「樂普」是有很多副作用的東西，把所有的病症都歸在「樂普」身上，結果影響了推行工作。

娠率僅六·八

實際數字或更低

根據追蹤調查的結果，裝置「樂普」後有一三四人妊娠，妊娠率為六·八(百婦女年)。但來複查的婦女中，很多是月經期只過了幾天，或因在授乳中而月經未來的，我替她們詳細檢查以後，就告訴她們再等待幾天，月經會來。對那些還在授乳的婦女，

就勸她們的嬰兒滿十個月以後應該斷奶，保證她們以後月經會來，教她們安心回家靜靜地等待，果然屆時月經來臨的婦女很多。

但有部份醫師聽說月經慢了幾天，便馬上採取措施，我認為她們應稍待時日，必須確定有無妊娠，然後再替她們想辦法。這樣做的話，我相信裝置「樂普」以後的妊娠率，可能比我們調查的數字會更低些。

工作具備信心

推行自然順利

我根據追蹤及複查的結果，得到了信心：「樂普」的裝置和取出都很容易，很少副作用，妊娠率也很低，

是最經濟、最合適的避孕法。

我希望孕前衛生工作人員以及衛生局、所的工作人員，都有這樣的信心來推行工作，使一般婦女們對「樂普」有深刻的認識，因此也對它發生信心。

同時希望各位醫師同仁，要不忙麻煩，多向婦女們說明。很多不舒服的感覺都不是「樂普」的副作用。除非不得已，不要輕易替她們把「樂普」取出。對月經慢了幾天的個案，應確定是否妊娠，然後才替她們作個別的處置。這樣我們的「樂普」推行工作，才能打破種種誤會，並收到預期的效果。我們的工作，得到婦女們的信任，才會受到普遍的歡迎。

