

農葉信箱



畜家

小豬注射兔化疫苗

哺乳期中最爲安全

【問】：三品種白豬，在三十台斤左右時注射豬瘟疫苗，後經十二日死亡，病狀是發病不吃飼料，不走動無排泄，經三日後耳尖有紅斑，如出血狀，解剖後肝、肺等腫脹，大便秘且帶有粘液。請問是何病？（臺南六甲鄉水林村七七號林福文）

【答】：（一）小豬接受兔化豬瘟疫苗，如果在哺乳期中，免疫反應較少，損失亦少，離乳後久免疫反應增多，越嚴重。故小豬應在哺乳期中（六週至離乳）注射損失就少。

（二）免疫反應多因注射兔化疫苗而豬瘟毒質潛伏在體內之某種病原，併發複雜之疾病，例如水腫病、弓蟲病、肺炎、腸炎等等。

（三）按來信所述病狀尚欠詳細，但推想可能爲急性弓蟲病，此種病可用長效磺胺劑及比利美他命等治療。又「弓蟲病」對弓蟲病效果也很好，可試用。

（四）弓蟲病之特徵爲皮膚出血斑，淋巴腫脹，肺水腫，肝腫炎壞死，便秘，腸黏膜之壞死等。（張聯欣）

治療疥癬症

用硫磺水〇・五%

【問】：（一）硫磺水或硫化鉀治療疥癬病時，使用濃度〇・五%是否過量，BHC是否各農藥行均售？

（二）膿疱性皮膚炎及傳染性膿疱性皮膚炎要用什麼藥治療？硫磺水及煤油肥皂液是

否有效？

（三）關於大豆餅有脫脂與無脫脂者，對哺乳期母豬是否有關？母豬餵給無脫脂豆粉對仔豬白痢是否有關？（彰化大村鄉茄菜村七七號吳成已）

【答】：（一）治療疥癬病所用的硫磺水（硫磺石灰水）及硫化鉀均可用〇・五%擦洗或噴藥，此種濃度不會過量。BHC爲乳劑者對疥癬病治療較有效。可在農藥行或西藥行購買，如用高雄農化廠出品之六角牌十%BHC乳劑，加四十倍水就可。

（二）膿疱性或傳染性膿疱性皮膚炎，普通注射配尼西林可使其痊癒，另一面局部塗擦硼酸氧化鋅軟膏或磺胺軟膏，可使其很快的痊癒，塗藥以前可用一%之煤油肥皂水洗。

（三）養家畜用之大豆餅都經脫脂，大豆餅有二種，一爲壓榨者，另一爲使用油劑脫脂者，後者含油量少，而蛋白質高，兩者對仔豬白痢發生沒有什麼關係，但不要把大豆餅浸水發酸後飼餵。（張聯欣）

豬弓蟲夏季發生較多

肺炎型腸型症狀不同

【問】：（一）豬弓蟲病發生時期是一年四季都可能發生？或有季節性？

（二）該病是小豬發生？或成豬也會發生？飼養半年以上的豬隻，是否亦會發生？

（三）該病病原是否流動性？是放牧性或地方性？

（四）該病據說分爲腸型與肺炎型二種，病症各如何？

【答】：（一）豬弓蟲病之發生並無一定季節，全年均會發生，惟在夏季發生較多，因夏天氣候太熱，豬隻抵抗力差，潛伏在豬體內之弓蟲容易發揮威力。

（二）弓蟲對各種年齡之豬隻均有病原性，一般來說年齡大的經產母豬，多會患隱性感染，故不會再感染。乳豬在哺乳期間，由母乳獲得抗體亦較少發生。發生較多的年齡以離乳後中豬至成豬階段的豬隻，尤其種豬多發生於配種後至妊娠時期。胎兒可經胎盤而

農藥字第0231號

好速

大必隆乳劑

ORTHO DIBROM 8E

低毒性蔬菜害蟲用藥

功效特點

- 殺蟲範圍廣泛藥效迅速
- 適用雨季及多雨之地區
- 殘毒期短宜收穫前數日應用
- 對人畜毒性較低安心使用

台灣省植物保護會推廣

有效害蟲



斜紋夜盜蟲、小、菜、蛾、尺蠖、菜、心、螟、大、菜、螟、蚜、蟲、類、薊、馬、類、蕃、茄、夜、蛾



製造廠：CHEVRON CHEMICAL COMPANY ORTHO DIVISION U.S.A.

總代理：惠農股份有限公司

台北市長安東路2段16號 電話：52093

經銷：惠光貿易有限公司

台南市東門路140號 電話：4971

*註冊商標