




注意衛生養好羊！

李進益

羊病的發生，和飼養環境有密切的關係。綿羊對寒冷抵抗性強，但對高溫多濕的環境，則抵抗性很弱。山羊好運動，適合在起伏不平、多石地等環境下飼養，粗剛青料如樹葉等也能採食。如能了解它們的習性，選擇適宜的飼育場所，建設合於家畜衛生要求的畜舍，並改善飼養管理的環境，當可減少疾病的損失。

(續第十七卷 四期)

原因：①

由氣管炎、鼻卡

他繼發。

②因氣候不順，氣候急變，寒冷時剪毛，或吸入塵埃而發生。

③因藥劑、飼料之誤而發生。

療法：①羊舍內填草，防賊風，保持溫暖，給與良質粗飼料和容易消化的高蛋白飼料。胸部行溫箱或以樟腦精、芥子末等薰布，並保持安靜。②盤尼西林、磺胺劑和其他化學療法外，強心利尿劑之內服。

③葡萄糖、林格兒注射；併用時有著效。

(5) 熱射病、日射病

症狀：①以疲勞、發汗(山羊無)、不安和高熱為前症。

②重症者肌肉痙攣，運動障礙，茫然佇立，半開眼眺視周圍，或失神，少數病例有興奮狀態。

③眼結膜充血，呼吸困難。

④急性者在短時間內顯著衰弱，虛弱死亡。

原因：多因夏天高溫多濕，羊舍通風不良，妨碍體溫散放而發生。

治療：①以早期發現處置最為緊要。隨即移至涼爽場所，使它安靜。

②輕症時行頭部灌水或以冷水洗腸，又充分給水，即可回復。

③重症時，除前記處置外，應行強心劑的皮下

注射。興奮劑的效果也很好。瀉劑以人工鹽八十至一百五十公克加二公升水溶解投與。

④必要時瀉血後注射林格兒。

(6) 腐蹄病

症狀：①初期呈輕度跛行，蹄有發熱，患部稍為濕潤或有白色滲出物，也有發生小丘疹者。有惡臭為本症的特徵。

②後炎症波及蹄冠部的軟組織，多形成膿瘍。

③重症時炎症蔓延至骨及韌帶，蹄角質部細碎也會死亡。

④慢性時蹄變形，角質脫落。

⑤不活動，食慾減退，營養低下，生產減退，也會死亡。

原因：①細菌感染。

②羊舍床架不潔，在濕潤草地放牧，繫牧，梅雨期在不良道路步行，及疏忽剪蹄為其誘因。

治療：①先剪蹄。角質壞疽和其他病變部應小心削去。

②輕症時用五—一〇%硫酸銅液或五%福馬林溶液腳浴約十分鐘。

③重症時用三〇%硫酸銅溶液，一〇%福馬林溶液腳浴十分鐘。

④膿瘍應切開排膿，填硼酸末和漂白粉的等量混合劑，效果大。

⑤塗布磺胺劑軟膏和粉末也有效果。

(7) 皮膚蛆蟲病

本症於夏天紅頭蒼蠅多時，在本省各地，尤以山地發生較多。症狀嚴重。

四時甘藍 “金 力”

TENRI HYBRID CABBAGE “KINRYOKU”

天
理



交
配

- ①本種耐暑，耐旱，耐病性等極強，適合本省氣候條件栽培。
- ②品質良好，生食，煮食均可。
- ③過年可栽種。
- ④育苗30天，定植後60天可收穫，每棵重量2公斤程度。
- ⑤以1尺6寸方栽種每分地4,500棵，宜密植。
- ⑥生長快施肥要配合好。
- ⑦本公司備有樣品待索，希望試種者請函索即寄。
- ⑧本公司另有洋蒜種子(リーキ)草花種子等現貨供售。
- ⑨本公司生產元：日本大和農園株式會社
- 臺灣總代理：新裕興企業股份有限公司
- 臺北市迪化街一段一四九號 電話：43787

症狀：①外傷、褥創、除角、斷尾、產後陰部惡露污染等，被紅頭蒼蠅產卵一至二日後幼蟲孵化，患部腫脹，漏出特異腥臭膿液。

②患畜不安，不時跳動，可抵觸部位用口咬痒，舐嚼，如頭部以突擦頻頻搖頭走動，患部腫脹迅速擴大侵蝕，呈嚴重症狀。

③如不能早期發現殺死蛆蟲，則併發其他疾患。

原因：紅頭蒼蠅蛆蟲寄生。