

能每四小時把小猪放入哺乳一次，體重大的放後面乳頭，體重小的放前面乳頭，幾天後，每隻仔猪吸食乳頭就會選定。由於前面乳頭乳水多，後面的較差，仔猪發育可趨平均。

母猪產後，飼料給與量宜逐漸增加，至第七、八天才恢復正常給與量。哺乳期的母猪要餵多少飼料，是要看仔猪數多少來決定的。假如是十頭以上，應該是任食，一直到離乳前才減少下來。和懷孕期一樣，飼料內要富有蛋白質。此外，青飼料仍要供應些。

仔猪在生後二星期，生長迅速，母猪乳已不足其生長所需，因此，在第三星期就開始餵給仔猪飼料。各地農會飼料廠都配有此種飼料（屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、草屯鎮、朴子鎮、關山鎮、頭城鎮、蘇澳鎮、斗南鎮、佳里鎮、善化鎮、歸仁鄉、學甲鄉等農會），仔猪飼料內所含蛋白質量，應為百分之二十左右。脫脂奶粉是仔猪飼料內不可缺少的原料，一般最好用一〇至一五%。飼料中如能含有百分之五的猪油，可以使仔猪生長更為迅速。糖與味精，可以增進仔猪對飼料的口味，一般可以參入百分之十的紅糖或百分之五的糖蜜。為防止仔猪自痢，應加入抗生素。其他如礦物質、維他命等，也很重要。生雜質是上述三項混合劑，可以摻用。

仔猪的飼料利用效率是二比一，也即餵二斤飼料就可多得一斤猪，多餵料非常合算，因此，仔乳飼料應該要日夜供應，青飼料每日可供應一、二次，在不致拉稀糞的原則下可以多給些。另外，每日放一、二把乾淨的紅土給猪啃食，這樣可以預防貧血病的。

仔猪保溫非常要緊，不管天氣多熱，保溫二天總是要的。冬天且須保溫一星期。如無電熱球，用一百燭光的電燈也可以。驅除蛔蟲、預防注射等，相信農友們都會注意到。

早斷乳·胎數多

(7) 斷乳：仔猪斷乳，原則上越早越好，因為母猪早配種，可以節省母猪飼料，增加產胎數，但不可早過二十八日；原因是這個時候斷乳，母體內生殖器官還沒完全恢復，會影響下一次的配種和產仔數。一般情形，如仔猪生長情形良好，五週至七週間離乳最為適宜。

離乳前一、二天，母猪應少餵飼料。離乳後二、三日以後，再恢復飼料量，進入配種期。按照上期所講的方法多給動物性蛋白質飼料，這樣第二次配種生產就可順利了。

純西洋種猪怎樣養法，已介紹如上，為了要讓農友們明瞭仔猪是怎樣生出來的，還說明了些猪的生殖生理。事實上，純西洋種和本地種或一代雜種母猪，它們生產小猪的機能並沒有什麼不同，只要再注意下述幾點，當會飼養成功。

急抱「仔」·無好處

①純西洋種猪生長快，容易長肥，必須給與充足的青飼料和適當的運動。

②純西洋種猪發情沒有本地母猪

日產農藥

銘謝年年惠顧
今年仍請倍加愛顧



使用農藥請指定最信用
最可靠的 日產農藥

中日合作成品

快必日必安日產日產日產日產
安效產愛利馬拉由滴益
乳劑(登記証1061)
乳劑(登記証1069)
乳劑(登記証786)
乳劑(登記証780)
乳劑(登記証1058)
乳劑(登記証782)
乳劑(登記証778)
乳劑(登記証819)
乳劑(登記証851)

日星牌荷蒙綠(混合肥料)(肥料登記第77)

進口原裝貨

必愛用乳劑(登記証192)
益農產乳劑(登記証827)
飛佈達粉劑(登記証155)
水銀粉劑(登記証244)
銅水和劑(登記証251)
殺菌噴水和劑(登記証440)
2-4-D除草劑(登記証633)
大生精液劑(登記証385)
日展展着劑

台灣日產化工股份有限公司

日星實業股份有限公司

台北市南京西路五號之 電話：33041-1