

碎切須不猪餵株米玉 粉澱爲多物出抽氮無

養猪答問

東鄉里港鄉磚仔地丁自由

(1) 農復會黃嘉先生，他曾在「豐年」第十七卷第二期十七頁發表一文，提及糊熟期玉米穗和玉米稈，不知兩者含有什麼養分，請指示。本人擬將其粉碎後代替牧草粉來養猪，不知可否？

(2) 又所謂無氮抽出物，對於猪體作用如何？並請解釋其意義。(屏)

(1) 玉米全株在玉米穗糊熟期(即玉米粒已飽滿而尚未硬熟時)，可將全株刈下，不必切碎即將全株飼猪，猪先吃穗(第一次要將苞葉剝出露米，猪才食吃)，再吃葉，再吃稈(第一次會吐渣)，約半小時即吃完，隨下一些渣滓。

此時玉米全株的成份爲：乾物質二六·九%，蛋白質二·一%，脂肪〇·七%，纖維六·二%，無氮抽出物一六·六%。

(2) 無氮抽出物爲全部乾物質中除去蛋白質、脂肪和纖維三項以外的成份，大部份爲澱粉。(黃嘉)



④ 純西洋種猪對於飼料供應頗爲敏感，多餵了容易肥，蛋白質量少了容易流產，因此必須按照上述分期養法飼養。

⑤ 仔猪不論在胎內或哺乳中，生

分期養·包成功

那麼明顯，容易錯過配種適期，因此當第一次發情，就要注意它的發情週期和發情停留期多長，算準日期，準備配種，這樣自會成功。

③ 純西洋種猪成熟較慢，因此在美國多在生下第十一個月才配種，那時候，體重已在一百公斤左右，這和本地母猪六十公斤時就配種完全不同。飼養西洋種母猪，千萬不要性急，抱「仔」心切，提早配種，結果是會失敗的。讓她發情四、五次才實施第一次配種，並不會太遲。

長都比三品種猪迅速，因此，在懷孕後期和哺乳期間，必須加倍注意母猪飼養，讓母猪懷孕期間(尤其是後期)增加體重一百磅(七十五公斤)，這是飼養純西洋種母猪的要訣，不可忘記。

農友們能再注意上述五項，純西洋種母猪當會養成功。小規模養母猪，可養在猪舍內，設有運動場。但養上十幾頭或幾十頭，就得有個放牧場，到了懷孕後期才趕入產房。等以後有機會再給大家介紹大規模飼養母猪的方法。

「純西洋種確比三品種猪長的快，省飼料。要養猪，就該養純種！」這是去年全省肥猪比賽第一名屏東縣長治鄉邱貴昭農友參加綜合性養猪計劃達四年的經驗談。希望已經飼養一代雜種母猪的農友們再作努力，使本省猪種改良早日成功！

當您身體不適時需找醫生，
可是當農作物受病蟲侵襲時，請來找我們……

發財農藥會帶給您豐收發財



請用：

萬靈松乳劑

二、三化螟蟲特效藥
，低毒速效

美稻松乳劑

水稻害蟲綜合性殺蟲
劑

6.5% BHC 水懸粉

飛蟲、浮塵子特效藥

3% BHC 粉劑

飛蟲、浮塵子特效藥

強力加收成水懸粉

紋枯病特效藥

美農乳劑

稻熱病特效藥

西樂生石灰

稻熱病特效藥

鳳梨發乳劑

鳳梨介殼蟲、心腐病
特效藥


保滿丹粉劑

甘薯簽貯藏用藥

殺鼠靈毒餌餅

安全殺鼠靈藥

(本公司農藥均持有)
農林廳登記證



亞洲化學股份有限公司
嘉泰企業股份有限公司

公司：臺北市中正路1140號之四(二樓)

電話：四五八一五

工廠：臺北縣中和鄉四十張

電話：92-2430