

箱信葉農



害蟲病

包心白菜露菌病
宜用「鮮乃浦」防治

【問】(1)附上標本包心白菜是何病名？
用何藥劑防治？

【答】(1)石灰波爾多液防治包心白菜露菌病有
效力否？
【答】(1)根據標本鑑定，是白菜露菌病
為害。

【問】(1)石灰波爾多液之使用過去很普遍，但
現多用「鮮乃浦」或「錫乃浦」四〇〇倍稀
釋液，每隔七天一次，連續三、四次，施藥
時應噴射葉片之上下兩面，收穫前七天停止
用藥。(劉康鑑)

早田除草「多谷乳劑」

【問】(1)因為本地方很多農藥標仔，但
是這幾年來常發現這種怪病。現在我附標本
以備貴社研究，用何種藥品可防治，或何原
因？

【答】(1)大蒜赤銹病是用人生七八、二二、四
五、三種藥品何種有效？

【答】(1)殺草劑對水田有效，但是早田是否有
效？用何種殺草劑？(雲林縣利鄉埔仔村
六四號李武大)

【答】(1)寄來的蒜病害標本係受萎縮
病病原菌所為害者，至目前為止，尚無何
種藥劑得予直接防治。

(1)迅速去除病株，集中焚燬。
(2)每隔七天撒佈五〇%「馬拉松乳劑」

一〇〇〇倍稀釋液，或二・五%「魚藤精乳
劑」一五〇一五〇〇倍稀釋液一次，採收四
天前停止用藥，驅殺能媒介此病傳染之蚜蟲

【大蒜赤銹病用「人生七八」「人生四
五」有效。

【早田雜草用除草劑，胡蘿蔔、花生、
玉米等可用二五%「多谷乳劑」一五〇一
二〇〇倍稀釋液，播種後土後噴灑於畦表，每
公頃每次用六八公升藥量，粘質土壤用八
公升，過乾土壤用二〇〇倍稀釋液。

(注意事項：(1)宿根性雜草不受藥劑控
制，故整地時應徹底根除。(2)夏季連日下雨
時不宜施用)。以上於田中曾試驗故祇能供
為參考。

水田雜草可用五%「多谷乳劑」。(吳
福壽)

柑桔發生黃龍病 可引起細根腐爛

【問】(1)柑桔的根病有幾種？
(2)柑桔的細根腐爛是何種病徵？
(3)柑桔葉脈變黃而落葉是什麼病？葉肉
變黃是何種病？柑桔缺少各種肥料要素的病
徵是什麼現象？

【答】(1)柑桔的根病有幾種？
(2)肥傷之病根有何種現象？(臺中縣東
勢鎮東安里二一七號林瑞男)

【答】(1)柑桔根的病害主要有根腐病。
(2)黃龍病發生亦會引起細根之腐爛，根
腐線蟲亦有同樣病徵。

【三主要是黃龍病。葉肉變黃，微量元素
缺乏多如此。

缺少肥料多呈葉肉黃之現象。
因只憑幾根根腐實無法斷定。所能示知
各種情形，如地下水的高低，在地性質如何
等等。

(4)肥傷多呈黑或褐色腐爛，需實際觀察
才能知道。(劉康鑑)


東海牌動力噴霧、灌水兩用機

日本政府 JIS 檢定合格

幫浦效率最高

附三菱牌單相馬達
一馬力及附屬品，
亦可調換汽油引擎
使用。

重量：17kg
送水量：噴霧每
分29公升
灌水每分
53公升



優點：


- ①24小時繼續使用不損機件。
- ②抽水可送達200公尺高處傾斜度90°仍可到達。
- ③用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用。
- ④本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完。

岡恒老牌

天下一品

赤白ビニール卷

現貨供應



採果鉗 野叉鉗 挖木刀 剪樹鉗

總經銷 新高貿易股份有限公司 臺北市峨嵋街68號 電話：34190 號

サンケイ



農藥

最優良的水稻蔬菜果樹雜穀殺
菌劑・最新有機水銀劑的霸王
水稻 稻熱病之剋星

米穀樂淨

ミクロチン

水溶劑
乳劑 3



(進口原裝 現貨供應)
愛文標果苗大量生產
有意採購者請照會

臺灣省政府農林廳農業
登記證第 〇〇三八六號
六六四號

現貨供應處 日星實業股份有限公司
臺北市南京西路五號之一
電話：59961-4

製造元：日本サンケイ化學工業株式會社
總代理：臺灣農產企業股份有限公司
臺北市迪化街一段八十六號 電話 44253・42365