

千層皮和日本所用的各種樹種都可作試驗選拔的對象。

(2) 防風林的位置：應該根據地勢、地形和風向來決定防風林的適當位置。茲依風向說明如下(圖六)：

① 吹過山頂的風：防風林應設置於山頂。山腰防風林防風效果低。

② 橫吹斜坡的風：防風林應設置於斜坡凸出部位。凹部防風林防風效果小。

③ 吹入山谷的風：除山谷中心凹地以外，鄰近斜坡也須設置防風林。

④ 直接吹至平臺的風：防風林應設置於平臺向風的邊緣；其他部位設置防風林防風效果小。

⑤ 從平臺上吹下的風：防風林仍須設置於平臺邊緣。

⑥ 正面吹至階段的風：防風林應設置於階段外側；設於內側者防風效果小，且易阻止冷氣的下降。

(3) 防風林的構造：據試驗結

果，在平坦地上，密閉度七〇%的破風林，具有樹高七倍距離的防風效果。例如樹高六公尺的防風林，防風距離為四十二公尺，應每隔四十公尺設一排防風林。完全密閉的防風林，易起旋風為害柑桔樹，所以以保持五〇至七〇%密閉度為宜。

在傾斜度十五至二十度的斜坡地所設置的防風林，具有與防風林同高距離的防風效果。所以斜坡地的防風林距離，應視傾斜度大小和防風林樹種高低而做適當的調整。

一般斜坡地，第一排防風林下半側可完全密閉，以減輕風害。其他防風林則須維持五〇至七〇%的密閉度。

有霜害的斜坡，防風林宜調節至五〇%左右的密閉度，第二排以後的防風林，須找去下方枝葉，以免冷氣滯留。

臺中臺北花蓮農友

希及時參加滅鼠工作！

野鼠為害農作物，損失很大。本省在民國四十六、四十七年實施全面野鼠防治後，鼠患曾一時減低，但以野鼠繁殖迅速，不久又恢復了以往猖獗為害的狀態。自五十年以後，政府又每年發動野鼠防治一次，但因所需經費浩大，無法實施全面防治，只發動農民實施適期同時防治，所以迄未達成理想的防治效果。


為減輕田間農作物因鼠害而引起的損失，省野鼠防治委員會(由農復會、糧食局、臺糖公司和農林廳組成)今年仍將推動各縣市局督導各鄉鎮繼續辦理野鼠的適期同時防治工作。根據預定計劃，臺中區(包括臺中縣、南投和彰化)的最適放飼毒餌時期是三至四月，臺北區(包括臺北縣、宜蘭、基隆和陽明山)和花蓮區的最適放飼毒餌時期是四至五月，希望上述地區的農友們踴躍參加這個活動。至於用藥量，如用毒餌餅時，耕地或公共地每公頃約需七十六個，農戶每戶約需十九個；如用〇·五%殺風靈時，耕地或公共地每公頃約需〇·二公斤，農戶每戶約需〇·〇二五公斤。(美)



豐年牌農藥

- ◆ 水稻螟蟲大剋星：
 - 力克蟲乳劑 (登記七九五號)
 - 固殺松乳劑 (登記六一號)
 - 特快殺乳劑 (登記五四七號)
 - 富粒多乳劑 (登記五六七號)
 - 巴拉松乳劑 (登記四三八號)
- ◆ 防治稻熱病特效藥：
 - 豐年錠 (登記二九七號)
 - 新稻熱病粉劑 (登記九五七號)
 - 勃拉益斯液劑 (登記七六四號)
 - 勃拉益斯水和劑 (登記七八九號)

滿意的服務!!



司公限有份股工化農興

號七〇一·六〇一局日島：話電 號六之十路山中鄉肚大縣中臺