




裕隆
新產品

100cc 蘭美達


二輪機車

性能優越 經久耐用
乘坐舒適 售價公道



每輛售NT\$ 14,960.00元
請向本公司各代銷商洽購

DE-6A 型
七馬力半柴油引擎



各地抽水機裝修商均可代購
每台NT\$ 12,500.00元

裕隆汽車製造股份有限公司
台北市信陽街十六號電話：31434

(3) 產前產後的管理：母牛在產前最少有六個星期的乾乳期，太瘦弱的母牛，必須休息八星期或二個月。停止擠乳時宜逐漸行之，不可驟然停止，否則易使乳房發生麻煩。如乳汁仍多時，宜減少精料飼量，多給與粗料，使乳汁減少。在夏季供應優良的牧草，或給與適當的放牧，不必另餵精料。但牧草不足時，每天另補充精料約二、四磅。冬季除充分供應粗料外，宜給與精料。產前一星期，應給與輕鬆而有輕瀉性的飼料，如用燕麥和麩皮等量混合飼餵。精料給與量逐漸減少，並給以充分運動。生產時移於清潔安靜的產房。產前乳房擴張，略有乳汁分泌，可在二十四小時或三、四日內分娩，管理者必須有所準備。產後母牛須特別注意防寒熱。夏季牛舍空氣須流通。供給微溫的飲水；精料給與量則應加以限制。

生產後在二十四小時內仍不見胎衣下落，應請獸醫處理。下落的胎衣不可任母牛吃下。

擠乳・去角・配種

擠乳前給與精料。擠乳時先用溫水洗乳房，如

水中加漂白粉較為衛生。洗後即行擠乳。擠乳時不管用擠乳機或是人工擠乳，工作者要和氣。擠乳時間每日每次均有一定，每日二次或三次。當進行擠乳時，避免高聲喧嘩嘻笑而刺激乳牛，影響乳量。多產牛特別敏感，宜多加注意。

牛隻留角，管理不便，因此生後十天左右的犢牛，應實施去角。去角的方法，是在生角的部位，剪去直徑約二公分圓形的被毛，四周塗布凡士林，然後用水浸濕的奇性鉗或鉗棒，反覆在生角處摩擦，直到皮膚微微出血時為止，燒去角的生長點，破壞角的生長細胞，自此牛角不會生長出來。

生長女牛到十個月齡時，有一部份已開始發情，但此時配種過早；最適配種年齡在十八個月左右。牛隻第一次發情後，每隔三星期左右發情一次（懷孕後則停止發情）。每次發情繼續一〇・五—三〇小時，在發情停止前一小時至終了後二小時之三個鐘頭內受胎率可達九三・三%，因此飼養者經常注意觀察，把握適當時間內行人工授精。

其他管理注意事項

飼養乳牛，除上述幾項較為重要的工作外，還有一些零碎的工作也應注意：

(1) 充分供應清潔的飲用水。一頭健康的乳牛，每日約飲水二十加侖。

(2) 外寄生蟲的驅除。如放牧牛隻，在臺灣任何地區都有牛壁蝨存在，為預防由牛壁蝨媒介發生的疾病，最少每二週要噴霧驅蟲藥劑一次，經常保持牛體無寄生蟲附着。效果最好而又使用簡便的藥劑是 Auroclon；以〇・一五%水溶液噴射牛體。

(3) 梳刷牛體，可促進牛的血液循環，同時可減少塵埃落入乳桶中，能提高牛乳品質。

(4) 牛舍內須常用墊草，尤其是冬季和犢牛舍內更為重要。

(5) 糞便適當處理，最好施用於牧草地。

(6) 要有記錄，如配種、生產和每日泌乳量等，都應詳細記載，以作選擇優良牛隻的依據。

— 全文完 —